

RASADNIK RUŽA

Virag

KATALOG 2013/14


www.virag-roses.hr



Hibridne čajevke



VELIČINA
GRMA



VELIČINA
CVIJETA




MIRIS



OTPONOST
NA BOLESTI



RAZMAK
SADNJE



Acapella

Tantau 1994

Mirišljava dvobojna
čajevka otporna na
bolesti.



Foto: Silvana Goja, Ugljan



Aqua Schreurs 2000.

Niža čajevka pogodna za proizvodnju ruža za rez. Gotovo da nema trnja, brzo obnavlja cvatnju. U lošim godinama problemi s pepelnicom i pjegavosti.




Foto: Mladenka Nimac, Benkovac



Aruba Schreurs 2000.

Po visini slična Aqui a također pogodna za proizvodnju ruža za rez. Cvjetovi žive žute boje s rozacrvenim rubovima.



Black Magic Tantau 1995.

Tamnocrvena hibridna čajevka pravilnih izduženih pupljaka. Pogodna za rez. U lošim godinama može imati probleme s pjegavosti.



Asja Mc Gredy 1998.

Pupoljci izduženi, cvjetovi narančastocrvene boje. Pogodna za rez.



Augusta Luise Tantau 2007.

Čajevka s cvjetovima u stilu starinskih ruža. Mirišljava, prekrasna boja. Cvjetovi pojedinačni ili u grozdovima najljepši u jesenskoj cvatnji.



Big Purple P.Stephens 1986.

Ruža sa snažnim mirisom. Cvjetovi prekrasne ljubičaste boje s primjesom purpurne.




Blue Moon Tantau 1964.

Jedna od najboljih u plavoj boji. Snažan miris i dugotrajna cvatnja do kasne jeseni. Nema puno izboja kao i većina plavih ruža.



Double Delight Swim i Ellis 1977.

Dvobojna ruža s jakim mirisom. Dosta cvate, no cvjetovi su osjetljivi na kišu.



Desire

Cvjetovi krupni, nježne roza boje. Brzo obnavlja cvatnju, otporna na bolesti.



Duftzauber Kordes 1984.

Još jedna mirišljava ruža. Cvate bogato, cvjetovi krupni, otporna na bolesti. Jake sadnice i grmovi.



Elina Dickson 1983.

Upadljivo krupni cvjetovi svjetložute boje u početku a kasnije blijede boje bjelokosti. Miris voćni. Cvjetovi otporni na kišu. Grm visok, gust, cvate do kasne jeseni.



Elle Meilland 2003.

Nagrađivana sorta. Više nijansi nježnih boja s izraženim mirisom agruma. Grmovi kompaktni, vrlo zdrava ruža.



Golden Monica Tantau 1988.

Nastala mutacijom narančaste Monice. Ista ruža samo u žutoj varijanti. Cvjetovi nešto sitniji, no cvatnja je obilna i brzo se obnavlja.



Golden Tower Tantau 2005.

Novija žuta čajevka. Izrazito bujna s dugim izbojima skoro bez trnja. Cvjetovi krupni prekrasne žute boje.



Imperatrice Farah Delbard 1992.

Cvjetovi na dugim stapkama, zvjezdastog oblika. Puno izboja po grmu, brzo obnavlja cvatnju. Ime dobila po iranskoj kraljici.




Ingrid Bergman Poulsen 1986.

Kрупni cvjetovi tamnocrvene boje blagog voćnog mirisa. Izboji kruti i uspravni, lišće kožasto. Što se tiče vrtnih crvenih hibridnih čajevki naš je favorit.



Marchenkönigin Kordes 1986.

Pupovi izduženi. Prekrasna nježna roza boja cvjetova. Cvate obilno. Dosta otporna na bolesti.



Kristov Jubilej Josip Rogin, Hrvatska

Jedna od rijetkih ruža porijeklom iz Hrvatske. Uvedena od strane Josipa Rogina iz Dumovca pokraj Zagreba. Na rozažutoj podlozi cvijeta nalaze se crvene točkice kao da je cvijet poprskan kapljicama krvi.



Landora Tantau 1970.

Dosta umnožavana žuta ruža zbog otpornosti cvjetova na kišu, a kožasto lišće daje joj i otpornost na bolesti.



Melody Parfumees Dorieux 1998.

Intenzivna plavoljubičasta boja cvjetova i snažan miris glavni su razlozi da je imate u svom vrtu.



Monica Tantau 1986.

Tanki pupoljci otvaraju se u prekrasno oblikovane cvjetove izvanredne boje. Na prvi pogled boja je narančasta, no s donje strane latica nalazimo zlatnu i crveno-narančastu. Ima puno izboja. Pogodna za rez.



Michelangelo Meilland 1997.

Žuta ruža koju možemo svrstati i u grupu tzv. romantičnih ruža. Okrugli pupoljci otvaraju se u cvjetove šaličastog oblika poput starinskih ruža što baš i nije karakteristika hibridnih čajevki. Lišće svjetlozeleno, cvate do kasne jeseni.



Moonstone Tom Carruth 1998.

Uspravni izbojci nose krupne pojedinačne cvjetove boje slonovače s roza preljevom po rubovima latica. Pogodna za rez.



Nostalgie Tantau 1986.

Ima neobične kuglaste dvobojne cvjetove. Otporna na bolesti, grmovi zbijeni, kompaktni.



Traviata Meilland 1998.

Crvena hibridna čajevka iz grupe romantičnih ruža. Izboji kruti, uspravni. Cvjetovi krupni, starinskog izgleda, latice tvrde. Naša preporuka.



Remy Martin Royon 1995.

Čajevka prekrasne konjak boje. Brzo obnavlja cvatnji i gotovo uvijek možemo pronaći po koji cvijet na grmu. Drugi naziv za ovu sortu je Magic Lantern.



Tineke Terra Nigra BV

Prekrasna bijela ruža pogodna za rez. Bogato cvate. Naša preporuka za bijelu ružu.

Engleske ruže

Engleske ruže možda i nije pravi naziv za ovu skupinu, jer danas nastaju nove sorte i u drugim zemljama. Prve sorte nastale su u Engleskoj u vrtu Davida Austina. Svijet ih je prihvatio i danas su sve popularnije. To je zapravo podgrupa grmolikih ruža, a nastale su križanjem starinskih s modernim sortama. Većinom su to zbijeni grmovi široka raspona boja i staromodna izgleda. Dosta su otporne na bolesti, a poznate su i po mirišljavosti.



Abraham Darby Austin 1985.

Cvjetovi izrazito krupni, profinjene boje s naznakom ružičaste, žute i boje marelice. Intenzivni voćni miris. Nakon kiše grane se savijaju od težine cvjetova. Može se formirati i kao penjačica uz potporanj.



Queen of Sweden Austin 2004.

Pogodna za vrtove ali i za aranžiranje. Vrlo zdrava, šarmantna ruža u svim fazama. Ime dobila po švedskoj kraljici Kristini iz 17. stoljeća.



Leander Austin 1982.

Engleska penjačica starijeg datuma. Čitava skupina engleskih ruža dobila je po njoj ime. Cvjetovi boje marelice stvaraju se u grozdovima. Otporna na zimu.



Tess of the d'Urbervilles Austin 1998.

Crvena engleska penjačica. Grane se često povijaju od težine cvjetova. Ime je dobila po poznatoj noveli Thomasa Hardyja.



James Galway Austin 2000.

Novija engleska ruža. Penjačica prekrasne boje i oblika cvijeta. Ime dobila po svjetski poznatom flautistu.



Crocus Rose Austin 2000.

Jedna od boljih engleskih ruža. Grmovi kompaktni. Cvatnja je obilna i brzo se obnavlja. Cvjetovi imaju miris čaja.



Sophy's Rose Austin 1997.

Izgledom podsjeća na Cinije. Pogodna za uzgoj na gredicama. Brzo obnavlja cvatnju a cvate obilno.



Teasing Georgia Austin 1998.

2000. g. dobila nagradu za miris. Iako je grmolika ruža, može se uzgajati kao manje bujna penjačica i tada može narasti i do 2m.



Falstaff Austin 1999.

Cvjetovi sa 40-50 latica tamnocrvene do purpurne boje. Miris po starinskim ružama. Može uzgajati kao manje bujna penjačica.



Graham Tomas Austin 1983.

Jedna od najboljih engleskih ruža. Zlatnožute boje, starinskog izgleda, slatkastog mirisa i dobre otpornosti na bolesti. Ime dobila po vodećem stručnjaku za starinske ruže.



Rasadnik ruža

Novo Selo Podravsko

Naš rasadnik izdaje katalog svake druge godine. Sljedeće izdanje s dosta novih sorti i novim dizajnom izlazi u svibnju 2015. godine. Kako bi si olakšali posao oko zaprimanja adresa za slanje kataloga, odlučili smo stvoriti bazu podataka, tj. popis adresa ljudi koji žele da im se pošalje svaki naš novi katalog. Katalog za sezonu 2013/2014 koji ima 36 stranica naplaćujemo 12,00 Kn. U tu cijenu uračunati je i trošak poštarine. Cijena slijedećih kataloga ovisit će o broju stranica i ne bi trebala biti bitno drugačija.

Stoga, ukoliko želite da Vas upišemo u bazu podataka s adresama kako bi Vam slali svaki naš novotiskani katalog, molimo ispunite poledinu ovog formulara, izrežite i pošaljite na našu adresu. Podatke možete dostaviti i putem telefona kao i e-mailom.

Grmolike ruže

Grmolike ruže nisu mogle biti svrstane ni u jednu drugu skupinu ruža. To su ruže grmolikog izgleda, bujnijeg porasta, ali nisu bujne kao penjačice.

Pod nazivom grmolike ruže obično se misli na moderne grmolike ruže, no većina starinskih ruža u stvari su grmolike ruže. U podskupinu modernih grmolikih ruža spadaju i engleske ruže.



Foto: Sanja Grčić, Virje

Angela Kordes 1984.

Mnoštvo rozaljubičastih cvjetova gotovo prekriva grm u punoj cvatnji. Od njihove težine grane se savijaju prema van. Nagrađivana sorta, otporna na bolesti, slabog mirisa. 1982. godine dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Astrid Gräfin von Hardenberg Tantau 2001.

Purpurnocrvena boja cvjetova podsjeća na starinske ruže. Jak miris na citruse. Zdrava grmolika ruža.



Foto: Sanja Grčić, Virje

Red Eden Rose Meiland 2002.

Crvena verzija sorte Eden Rose. Cvjetovi u grozdovima, grane krute, otporna na bolesti.



Velika Gorica Josip Rogin. Hrvatska


Još jedna ruža porijeklom iz Hrvatske. Grmovi bujni. Cvjetovi nježne mareličaste boje. Pupoljci se relativno brzo otvaraju, no ruža brzo obnavlja cvatnju.



Foto: Sanja Grčić, Virje

Eden Rose Meiland 1985.

Poznata i pod imenom Pierre de Ronsard. Vrlo popularna grmolika ruža. Cvjetovi često zbog težine povijaju grane. Boja cvijeta jako varira u toku cvatnje; od krembijele sa crvenkastim preljevom u središtu cvijeta pa do roza nijansi. Miris slatkast. Mogući uzgoj i kao penjačica.



Manhattan Blue Tantau 1990.

Svrstavana i u floribunde i pokrivače. Mali grmovi jednostrukih cvjetova intenzivne purpurnoljubičaste boje. Neobična ruža.



Vaši podaci

Želim da mi pošaljete svako novo izdanje kataloga ruža na adresu:

Ime i prezime:


Adresa:

Telefon:

Potpis:

Rambler penjačice

Rambler penjačice su izrazito snažnog i bujnog porasta. Neke sorte narastu i preko 10 m. U pravilu nemaju puno trnja, a listovi su kožasti i svjetlije boje. Cvjetovi su sitniji od modernih climber penjačica, a formiraju se u većim ili manjim grozdovima. Skoro svi rambleri cvatu samo jednom, a cvatnja traje 3-4 tjedna sredinom lipnja. U punoj cvatnji izgledaju veličanstveno. Kod izbora sorti cvatnja jednom na godinu često odbija ljude od sadnje ovakvih ruža. No ukoliko imamo pogodan veliki prostor za ramblere, sigurno nećemo doživjeti razočaranje.



American Pillar Walter Van Fleet 1902.

Veličanstvena cvatnja u proljeće. Cvjetovi u grozdovima tamno-roza boje s bijelim središtem. Tolerantna na hladovinu. U lošim godinama ju napada pepelnica. Cvate jednom.



Bobie James Sunningdale, 1961.

Najpoznatija bijela rambler penjačica. Cvjetovi formirani u velikim grozdovima. Vrlo bujna. Ima izražen voćni miris.



Foto: Mateja Kardaš, Petrinja

Blue Magenta oko 1910.

Cvjetovi mijenjaju boju. U početku su tamnoroza i crvenkaste nijanse a kasnije prelaze u purpurnu i ljubičastu boju. Cvjetovi se formiraju u grozdovima. Grane gotovo bez trnja.



Tausendschön Schmidt 1906.

Ime „tisuću ljepota“ dobila je po nijansama bijele, svjetloroze i krem boje cvjetova. Vrlo otporna na hladnoću. Izbojci imaju malo trnja. Cvate jednom.

Climber penjačice

Skupina ruža koje se mogu penjati ako se pričvrste uz potporanj. Climber penjačice u stvari su moderne penjačice. Za razliku od ramblera imaju krupne cvjetove. Cvatnja je u pravilu višekratna. Najviše se koriste za prekrivanje dijelova kuće, lukova, ograda, pergola i sl. Od sorte do sorte miris varira. Nedostatak im je da nisu tako bujne kao rambleri pa tako najčešće narastu do 2,5 m visine.



Amadeus Kordes 2003.

Novija crvena penjačica. Cvjetovi u grozdovima prekrasne crvene boje. Vrlo zdrava ruža.



Elfe Tantau 2000.

Poznata bijelozelena penjačica. Listovi kožasti. Dosta cvate i brzo obnavlja cvatnju.



Foto: Sanja Grčić, Virje

Polka Meilland 1991.

Iako je penjačica, može se također posaditi uz stup, no neće narasti više od potpornja. Cvjetovi su boje marelice s nijansom boje lososa, što je danas vrlo popularno. Pojavljuju se u kiticama, ima ugodan miris. Lišće stalno svjetlozelene boje.



Giardina Tantau 2008.

Novija zdrava penjačica. Lišće kožasto, svjetlozelene boje. Cvjetovi u grozdovima. Vrlo zdrava penjačica.



Golden Gate Kordes 2005.

Novija žuta penjačica. Izboji jaki i kruti. Cvjetovi prekrasne žive boje, miris po citrusima. Godine 2006. dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Don Juan Jackson & Perkins 1958.

Jedna od najtraženijih ruža općenito. Krupni baršunastocrveni cvjetovi s jakim mirisom glavni su razlog za to. Grane krute, jake, lišće kožasto.



Parade Jackson & Perkins 1953.

Vrlo bujna penjačica. Cvjetovi krupni u kiticama, starinskog oblika. Mirišljava. Pogodna za pergole.



Foto: Milica Ljubej, Zagreb

Schwanensee Sam McGredy 1968.

Bijela penjačica s blagom nijansom roza boje u središtu cvijeta. Cvjetovi krupni, miris slab. Obično joj treba godinu-dvije da počne s bujnim porastom, no taj nedostatak kasnije nadoknađuje svojom ljepotom.

Floribunde

Floribunde svoje cvjetove nose u skupinama ili kiticama, a u svakoj kitici odjednom se otvara nekoliko cvjetova. Ova je skupina nenadmašna po bojama, pouzdanosti i dugotrajnosti sadnica, ali općenito oblik i veličina cvijeta manje su vrijedni nego kod hibridnih čajevki. Sorte iz ove skupine neprekidno cvatu tijekom ljeta i jeseni. Pogodne su za ovičenje staza, sadnju u cvjetne gredice, na kamenjaru i sl. Često se za ovu skupinu ruža koristi i naziv poliante. Poliante su bile prethodnice floribundi. Danas se malo uzgajaju zbog boljih osobina floribundi koje su ih potisnule. Poliante, za razliku od floribundi, imaju manji broj latica.



Aprikola Kordes 2000.

Grmovi kompaktni, lišće kožasto. Cvjetovi pastelne boje slične Zambri, no znatno je niža od nje. Godine 2001. dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Acropolis Meilland 2001.

Cvjetovi kuglasti, u grozdovima, neobične boje; mješavina svjetlo-roze i srebrne. Pogodna za gredice, brzo obnavlja cvatnju.



Friesia Kordes 1973.

Mirišljava žuta floribunda pravilnih pupova, prekrasne boje i obilne cvatnje. Vrlo dobra kao stablašica. Najviše umnožavana žuta floribunda.



Lavaglut Kordes 1972.

Bogati cvjetovi ove ruže privlače poglede svojom zagasitocrvenom bojom koja je gotovo nalik crnoj. Podjednako raste u širinu i visinu a cvate cijelo ljetno. Naša preporuka.



Johann Strauss Meilland 1993.

Bogato cvate, cvjetovi oblika hibridnih čajevki, jaki izbojci. Vrlo zdrava ruža. Idealna za sadnju na gredice.



Vaikiki

Cvjetovi u dvije nijanse roza boje. Izboji s malo trna. Lišće zeleno-crvenkaste boje.



Neon Kordes 2001.

Niža floribunda bogate cvatnje. Listovi sitni, kožasti, zdravi. Godine 1999. dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Midsummer Tantau 2008.

Grane se često povijaju od težine cvjetnih grozdova. Cvjetovi relativno крупni pa ju čak svrstavaju i u hibridne čajevke. Izbojci jaki, kruti često predugački za floribunde.



Mein München Cocker 1987.

Žutocrvena floribunda. Nešto bujnija od većine floribundi. Cvjetovi крупni te podsjećaju na cvjetove čajevki.



Red Leonardo da Vinci Meilland 2002.

Odlična crvena floribunda. Grmovi niski, kompaktni. Cvjetovi šaličastog oblika, lišće kožasto, atraktivno. Godine 2005. dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Rotilia Kordes 2000.

Floribunda sitnih crvenih cvjetova. Rastom slična pokrivačima. Godine 2002. dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Rock 'n' Roll McGredy 1988.

Cvjetovi žive, upadljive narančaste boje. Pogodna za gredice. Cvate obilno i brzo obnavlja cvatnju.



Papageno McGredy 1990.

Ruža sličnija čajevkama nego floribundama. Cvjetovi крупni za floribundu a po visini se također bitno ne razlikuje od čajevki. Neobična prugasta ruža.

Pokrivači tla

Uvedeni su 80-ih godina 20. stoljeća. Te puzeće ruže cvatu višekratno i imaju dobru otpornost na bolesti. Koriste se za prekrivanje padina i neuglednih površina, za sadnju između viših grmova, ili kao cvjetne gredice. Kroz par godina toliko se rašire da sprječavaju rast bilo trave, bilo korova. Rezidba je skoro nepotrebna osim šišanja ako prelaze preko predviđene površine.

Po visini razlikujemo niže – puzeće, i više – povijene pokrivače. Neki bujniji povijeni mogu se čak koristiti kao penjačice uz obavezan potporanj. U novije vrijeme sve su veći hit cijepljeni kao stablašice na veću visinu, čime se dobiva pendula ruža stablašica.



Fuchsia Meillandecor Meilland 1994.

Duge povijene grane nose ogromne grozdove sitnih cvjetova. Pogodna za javne površine i privatne vrtove.



Palmengarten Frankfurt Kordes 1988.

Dugo cvate, cvjetovi su u raskošnim kiticama, malo osjetljiviji na kišu. Miris po jabukama. Raste u širinu, rezidba skoro nepotrebna. Odličan pokrivač manje bujnosti.



Concerto Meilland 1994.

Boja varira od blijedožute do boje marelice i narančastocrvene. Grm raste povijeno. Lišće kožasto tamnozeleno, dobro se uklapa među trajnice. Grm nikada nije bez cvijeta. Naša preporuka.



Scarlet Meillandecor Meilland 1987.

Po izgledu grma ova ruža je slična sorti Fuchsia Meillandecor. Razlika je samo u boji cvijeta.



Swany Meilland 1977.

Lišće kožasto, cvjetovi čisto bijele boje starinskog oblika. Bez izraženog mirisa. Po nama jedan od boljih pokrivača tla.

Starinske ruže

Početkom XX stoljeća moderne ruže kakve danas poznajemo šalju u zaborav većinu starih ruža. Starinske ruže nikad neće nadmašiti ljepotu i savršenstvo hibridnih čajevki, floribundi, grmolikih i ostalih modernih ruža, no uvijek će privlačiti pažnju iskrenih zaljubljenika u ruže. Najstare grupe ruža na europskom tlu su alba ruže, galske, centifolie, moss i damašćanske ruže. Otkrivanjem novih svjetova u Europu dolaze ruže iz udaljenih krajeva a njihovim križanjem stvaraju se sve savršenije ruže i tako sve do 1867. kada je stvorena prva hibridna čajevka La France. Njena pojava predstavlja kraj ere starinskih ruža. Sve novonastale ruže poslije toga nazivaju se modernim ružama.



Jacques Cartier Moreau-Robert 1868.

Starinska ruža iz grupe Portland. Cvijet četvrtastog oblika, čiste roza boje. Miris bogat, slatkast. Cvate više puta. Odlična stara ruža, nama jedna od najdražih.



Baron Girod de l'Ain Reverchon 1987.

Starinska ruža iz grupe Hibrid perpetual. Cvate više puta, cvjetovi neobične boje. Traži sunčaniji položaj, malo osjetljivija na pepelnicu.




Fantin Latour prije 1900.

Starinska ruža iz grupe Centifolia. Bujni grm, krupni cvjetovi sa skoro 200 latica, izrazito otporna na bolesti. Cvate jednom, no nezaobilazna je sorta u svakom malom vrtu starih ruža.




Ispahan prije 1832.

Damašćanska ruža. Voli sunčane položaje. Grmovi kompaktni srednje bujnosti. Ime dobila po gradu Isfahanu u Iranu. Cvate jednom u rano ljeto.



Paul Neyron Levet 1869.

Starinska ruža iz grupe Hibrid perpetual. Ruža sa ogromnim cvjetovima prekrasne tople rozaljubičaste boje. Izboji skoro bez trnja. Miris izražen. Obnavlja cvatnju.



Leda prije 1831.

Damašćanska ruža. Cvate u kasno proljeće. Slabo obnavlja cvatnju. Cvjetovi bijele boje s više ili manje izraženim rubovima roza boje. Postoji i sorta Pink Leda u potpuno roza nijansi.



Mme Isaac Pereire Garcon 1881.

Ruža iz grupe Bourbon. Bujni otvoreni grm. Cvjetovi četvrtastog oblika. Prvi cvjetovi malo deformirani no u kasnijim cvatnjama savršeni. Miris odličan, šireći, podsjeća na kupine. Cvate više puta. Pogodna za uzgoj kao penjačica.



Reine des Violettes Millet-Mallet 1860.

Ruža iz grupe hibrid perpetual. Intenzivna purpurnoljubičasta boja cvjetova. Grmovi robusni. Otporna na kišu. Cvate više puta.




Foto: Mateja Kardaš, Petrinja


Rose de Rescht Lindsay 1930.

Starinska portland ruža. U Europu uvedena 1940., no porijeklo je nepoznato, vjerojatno Iran. Grm kompaktan. Cvjetovi crvenoljubičaste do rozapurne boje. Miris jak opojan. Cvatnja u ljeto uz slabiju cvatnju u jesen. Najbolja oštra rezidba u proljeće. Preferira sunčane položaje.



Rosa Mundi

Starinska galska ruža. Nastala je mutacijom Apotekarske ruže. Bila je sigurno poznata prije 1200.g. To je najranija poznata prugasta ruža koja se još uvijek umnožava. Poznata je i pod imenom Rosa Gallica Versicolor. Cvjetovi promjera 5 cm, miris lagan, cvate jednom.



Variegata di Bologna Bonfiglioli 1909.

Starinska ruža iz grupe bourbonki. Grmovi izrazito bujni. Bijeli cvjetovi su prošarani rozapurnim prugama. Otporna na kišu. Mirišljava.

Ruže stablašice

Bilo koja sorta ruža može se uzgojiti kao ruža stablašica. Ipak, u proizvodnji sadnica ruža stablašica koriste se sorte koje ispunjavaju određene karakteristike, a to su najčešće: otpornost na niske temperature, oblik krošnje, obilna cvatnja, gusta krošnja, otpornost na bolesti itd. Već nekoliko godina veliki hit su pendula ili »tužne« ruže stablašice. Kod njih koristimo sorte iz grupe pokrivača tla koji povijaju grane prema zemlji. To ne znači da sorte iz ostalih grupa ruža ne izgledaju dobro kao stablašice. Sve stablašice koje imamo u ponudi cijepljene su na 100 cm.



Bodenabend

Pendula tip krošnje – grane povijene prema dolje. Crveni jednostavni cvjetovi, cvate stalno i obilno. Inače, vani su ovakve stablašice sve popularnije, s tim da bi bujniji pokrivači trebali biti cijepljeni na visinu 140 cm. No željenu veličinu krošnje dobivamo rezidbom kako u jesen, tj. proljeće, tako i u vegetaciji.



Angela

Stvara veliku krošnju kao i većina grmolikih ruža. Cvate stalno. Grane blago povijene, vrlo zdrava.



Bonica

Jedna od dosta korištenih sorti za stablašice. Nježna roza boja, krošnja može biti dosta velika, grane idu u širinu.



China Girl

Novija sorta iz grupe floribundi. Po boji vrlo slična Friesii. Cvijet u otvaranju poprima više rozetastu formu, a i pupoljci se rascvjetavaju sporije.



Deep Impression

Cvijetovi izdaleka izgledaju crvene boje, no kod pogleda izbliza, vidljive su slabo izražene pruge bjelkaste boje. Krošnje srednje veličine, blago pendulaste forme. Novija sorta.



Sally Holmes

Izrazito popularna u SAD-u. Nenadmašna u cvatnji. Vrlo zdrava i otporna na zimu. Sorta iz grupe grmolikih ruža. Cvjetovi jednostavni ali krupni u grozdovima.



Friesia

Mirišljava žuta stablašica. Krošnja srednje veličine, cvate stalno, otporna na bolesti.



Lavaglut

Vrlo atraktivna zbog tamnocrvene boje i obilne dugotrajne cvatnje. Cvjetovi sitni. Naša preporuka.



Eden Rose

Stablašica iz grupe grmolikih ruža. Bogato cvate a boja ovisi o jačini sunca. U polusjeni roza preljev je jače izražen. Krošnja ogromna.



Foto: Milica Ljubej, Zagreb

Concerto 94

Pendula ruža stablašica koja obilno i stalno cvate, prekrasna boja, grane blago povijene. Naša preporuka.



Graham Tomas

Grane se povijaju od težine cvjetova. Prikraćivanjem grana na 40 cm u tijeku vegetacije, a nakon pojedinog ocvjetavanja može se formirati prekrasna krošnja.



Iceberg

Vjerojatno ne postoji ni jedan rasadnik koji ovu grmoliku ružu ne uzgaja i kao stablašicu. Bogato cvate, čista bijala boja cvjetova, a krošnja s vremenom može narasti i do 1,5 m promjera.



Rosarium Uetersen

Izrazito otporna na bolesti. Miris izražen, prva cvatnja veličanstvena.



Scarlet Meillandecor

Pendula krošnja slična kao i kod sorte Bodenabend, no cvjetovi imaju više latica i za nijansu su svijetlije boje.



Ingrid Bergman

Kрупni cvjetovi. Naša preporuka. Uspravna krošnja kao i kod svih čajevki.



Rock 'n' Roll

Krošnja srednje veličine. Intenzivna narančasta boja privlači pogled. Cvate obilno. Nešto starija sorta iz grupe floribundi.



Swany

Po nama jedna od najljepših stablašica. Cvjetovi srednje veličine čisto bijele boje, starinskog oblika. Krošnja srednje bujnosti, grana s cvjetnim kiticama povijene prema dolje.

Stablašice - savjeti

Ruže stablašice sadimo slično kao i sadnice klasičnih ruža. Razlika je u tome da cijepljeno mjesto na korjenovom vratu ne mora biti ispod razine zemlje, već sadnicu sadimo na dubinu kako je rasla i u rasadniku – cijepljeno mjesto je u razini zemlje. Kako bi spriječili oštećenja stablašica od vjetra, obavezno moramo postaviti kolac uz sadnicu i to na način kako je prikazano na slici. Ukoliko je sadnica ruže stablašice pakirana u mrežicu i u PVC vrećicu, najbolje je skinuti mrežicu i supstrat te saditi s golim korjenom. Funkcija supstrata i mrežice jest da održava korijen vlažnim do sadnje tj. sprječava sušenje sadnice. Pošto u supstratu ima i primjese piljevine, preporučamo neposredno pred sadnju skinuti mrežicu i supstrat.

Ruže stablašice su osjetljivije na smrzavanje od standardnih ruža. Odabirom zaštićenog mjesta gdje ćemo ih saditi smanjujemo taj rizik. Stablašice možemo saditi i u veće tegle ili neke slične posude. Tako posađene pametno je preko zime pospremiti u zatvoreni prostor. Poželjno je krošnju pred zimu zamotati papirnatom ili jutenom vrećom. Prije toga krošnju možemo ispuniti slamom.

Stablašice se mogu zaštititi i umatanjem krošnje granama crnogorice.

Rezidba se obavlja u proljeće, a prilagođavamo ju načinu rezidbe grupe ruža u koju spada na deblu nacjepljena sorta.

Zaštita od štetnika i bolesti ne razlikuje se od klasične zaštite ruža. Kod mjera njege imamo i odstranjivanje divljih izbojaka. Kod ruža stablašica razlikujemo dvije vrste divljih izbojaka koji se izgledom dosta razlikuju. Jedni mogu tjerati iz korijena, a njih se rješavamo bilo čupanjem dok su mlađi, bilo odgrtanjem i rezanjem pri osnovi kod korijena. Druga vrsta divljih izbojaka može tjerati iz debla i to češće prvih par godina, a njih kidamo pri osnovi čim ih primjetimo dok su još mali. Ukoliko ih ne bi odstranjivali, mogli bi narasti i do 2 m. Mjera njege je i odstranjivanje ocvalih cvjetova. To radimo isto kao i kod standardnih ruža. Kod pokrivača preporučamo da odredite visinu do koje želite da vam krošnja visi i povremeno je na toj visini potišćate. To se pogotovo odnosi na jako bujne pokrivače kao što je Bodenabend.

Veleprodaja sadnica ruža

Već dugi niz godina sadnice ruža iz naše proizvodnje isporučujemo u veleprodaji po cijeloj Hrvatskoj. Surađujemo s velikim brojem vrtnih centara, rasadnika, komunalnih poduzeća i poljoprivrednih ljekarni. Za takve namjene ruže se pakiraju u ambalažu sa slikama. U veleprodaji također imamo 70-tak sorti klasičnih sadnica ruža te 20-tak vrsta ruža stablašica.

Za jesensku sezonu narudžbe u veleprodaji primamo od 01. rujna a isporuka je sredinom listopada. Za proljetnu sezonu narudžbe primamo tijekom siječnja i veljače a isporuka je u

drugoj polovini veljače i početkom ožujka ovisno o vremenskim prilikama i krajevima u koje se ruže dostavljaju.

Za upit o cijenama i ostalim uvjetima u veleprodaji možete nam se obratiti:

- telefonom na brojeve: 042/810-176 te 091/562-88-02

- e-mailom na adresu: ivan.virag@vz.t-com.hr



Ukrasne vrbe

Salix caprea "Pendula"

U posljednjih nekoliko godina sve popularnije postaju biljke koje se mogu formirati kao stablašice. Jedna od takvih, dosta korištenih vrsta, je i viseća vrba *Salix caprea* "Pendula". Vrba je listopadna biljka. U rano proljeće na granama se pojavljuju tzv. mace koje su prvi znak buđenja prirode i početka vegetacije. Žuta boja mace daje posebnu draž i ljepotu ovih stablašica. Cvatnja traje 3-4 tjedna. Kasnije, uvegetaciji, formiraju se grane povijene prema zemlji. Iako nema druge cvatnje kao što to imaju ruže stablašice, grmovi ovih stablašica atraktivni su u svakom vrtu te se mogu kombinirati s dosta vrsta ukrasnog bilja.

Salix caprea "Pendula" kao i sve vrbe traži dosta vlage. Ukoliko se sadi u krajevima s manjkom oborina, treba računati na obilnije zalijevanje, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci.

Ukoliko želimo pravilan habitus tijekom cijele godine, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj rezidbi. Ljudi često samo podrežu grmove kako bi se formirala gusta krošnja. Time se dobiva gusta krošnja sa sve tanjim granama. Pravilna rezidba ove vrste vrba provodi se nakon cvatnje kad mace počinju otpadati. Sve tanke grane se odstranjuju pri osnovi, a jake grane se prikraćuju a svega 10-15 cm. Takvom oštrijom rezidbom izbjegava se gusta neugledna krošnja, a kroz 2-3 godine dobivamo prekrasne stablašice s jakim granama koje vise do zemlje.



Salix integra "Hakuro Nishiki"

Vrba s ukrasnim lišćem u tri boje; zelenim, roza i bijelim, također je dosta raširena i česti je stanovnik okućnica. Prema vlazi i tlu ima iste zahtjeve kao i *Salix caprea* "Pendula". Ne formira mace već je samo lišće vrlo atraktivno. U drugom dijelu vegetacije sve lišće postaje zelene boje. Kod ove vrste rezidba se provodi u rano proljeće prije kretanja vegetacije, i to na način da se samo "ošiša" krošnja i formira kugla. Može se reći da kod *Hakuro Nishiki* primjenjujemo rezidbu kao i kod živih ograda. Uzgaja se i kao stablašica na raznim visinama, no možemo je formirati i kao grm bez debla.



Salix "Kurome"

Ova vrsta dolazi iz Japana. Kuro znači tamna; crna a odnosi se na mace koje se pojavljuju u rano proljeće. Redovita rezidba osigurava kompaktni rast i velike mace. Također traži vlažno tlo ili obilno zalijevanje. Dobro podnosi kiselo tlo. Međutim, ukrasna vrijednost ove vrste leži u obliku i boji lišća. Oblik grana također određuje dekorativni izgled biljke.



Sadnja ruža

Sadnja ruža ne iziskuje neko posebno znanje, no ljudi često rade greške upravo kod sadnje pa se kasnije razočaraju, bilo u primitak sadnice, bilo u bujnost grma ruže. Ruže sadimo u jesen, što je puno bolje, no možemo ih saditi i u rano proljeće. Ukoliko ih sadimo pojedinačno, kopa se jama 50x50x50 cm. Na dno stavljamo zreli stajski gnoj, a na njega sloj rastresite zemlje. Nakon toga stavljamo sadnicu, i to tako da cijepljeno mjesto bude 3-5 cm ispod razine zemlje. Prije toga prikratimo vrhove korijena. Dobro je sadnicu prije sadnje sat vremena držati u vodi. Sadnicu koju smo smjestili u jamu zasipamo ostatkom rastresite zemlje i dobro nagazimo. Zalijevanje je obavezno bez obzira na vlažnost zemlje. Kod jesenske sadnje još nagnemo zemlju na posađenu sadnicu tako da grane vire van tek 1-2 cm. Ovaj humak štiti ružu preko zime od smrzavanja i bure u južnim krajevima. U proljeće humak moramo odgrnuti i poravnati. Kod proljetne sadnje nema potrebe nagrtati humak. Ukoliko ruže sadimo u gredice, dobro je gredicu dobro pripremiti; zemlju usitniti, pognojiti, a ukoliko je zemlja loša, skroz ju zamijeniti boljom. Na tako pripremljenu gredicu nema potrebe kopati široke jame već samo takve da ruže budu dovoljno duboko posađene.



Rezidba ruža

Često postoje nedoumice rezati li ruže u jesen ili u proljeće. U pravilu u jesen režemo čajevke, grmolike i floribunde u toj mjeri da ih preko zime ne lomi snijeg. To znači da ih jednostavno pošišamo na visinu 40-60 cm, ovisno o grupi. Pravu rezidbu vršimo u proljeće kad prestane opasnost od niskih temperatura. Način rezidbe ovisi o grupi ruža. Kod svih grupa prvo odstranjujemo tanke i suhe izbojke, a kod starijih grmova režemo stare i odrvenjele izbojke kako bismo ih vremenom "pomladili" i time spriječili stvaranje velikih panjeva. Kod čajevki ostavljamo izbojke dužine 15-20 cm bez bočnih grana. Kod grmolikih ruža ti izbojci su nešto duži; 40-50 cm, dok je kod floribundi dovoljno 10-15 cm. Pokrivači tla skoro da se i ne trebaju orezivati. Kod većine pokrivača prikraćujemo samo one izbojke koji se šire na neželjenu površinu, s tim da to možemo napraviti i u tijeku vegetacije. Ruže penjačice trebaju potporanj za rast. Prema vrsti potpornja (mreža, stup, pergola) prilagođavamo i rezidbu. Posao se svodi na to da ostavljamo jače grane i vežemo ih na potporanj. Prije toga ih prikraćujemo za jednu trećinu kako grm ne bismo preopteretili u rastu i razvoju. Bočne grane na ostavljenim izbojima kod penjačica prikraćujemo na 10-15 cm. Kod formiranja grma penjačica dobro je izbojke što više vodoravno savijati (ovisno o vrsti potpornja) kako bi grm što prije ispunio prostor. Kod uspravnog položaja grana često nam grm ostane gol čak i metar od zemlje. Zato trebamo ostavljati sve mlade izbojke koji tjeraju iz cijepljenog mjesta. Neki vrtlari smatraju da penjačice uopće ne treba rezati osim rezanja suhih grana. Time se s vremenom dobivaju ogromni grmovi. Smatramo da penjačice prvih nekoliko godina ipak treba rezati kako bismo formirali grm po želji. Penjačice tipa rambler režemo samo nakon cvatnje. Tada odstranjujemo ocvale izbojke te eventualno prorjeđujemo grm.



Osim standardne rezidbe postoji i rezidba u vegetaciji. Tu se misli na odstranjivanje divljih izbojaka te rezidba ocvalih cvjetova. Divlje izbojke koji tjeraju iz korijena treba iščupati ili odgrnuti zemlju i odrezati ih na mjestu gdje tjeraju iz korijena. Ocvale cvjetove odstranjujemo s 1-2 lista. Možemo napraviti i oštiri rez; 3-4 lista s ocvalim cvijetom. Tada će nam sljedeća cvatnja malo kasniti, no izbojci će biti duži i cvjetovi krupniji.

Zaštita ruža

Većina ljudi kad posadi koju ružu obično i ne misli da će je morati povremeno poprskati protiv bolesti i štetnika. Mnogi nas zovu u kolovozu i pitaju za savjet što da naprave sa svojim ružama jer im je otpalo lišće zbog napada bolesti. Tada je već kasno a zbog nebrige oko ruža doživljavaju razočaranje. Ruže se moraju prskati svakih 10-14 dana a ovdje ćemo vam pokušati što detaljnije objasniti s čime i protiv čega.

Manje šteta i manje problema trebali bi imati sa štetnicima. Najčešći štetnici na ružama su:

- lisne uši – *Myzus persicae*, *Macrosiphum rosae*, *Macrosiphum solani*
- razne gusjenice
- dlakavi ružičar – *Trapinota hirta*
- crni ružičar – *Oxythiraea funesta*
- zlatne mare – *Cetonia aurata*, *Potosia cuprea*
- pipe – *Otiorrhynchus sulcatus*
- trips – *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Heliothrips haemorrhoidalis*
- crveni pauk – *Tetranychus urticae*

Za razliku od bolesti, kod štetnika ne preporučamo preventivna tretiranja insekticidima. Suzbijamo ih kad se pojave a važno je odabrati odgovarajući insekticid. Razlikujemo kontaktne i sistemične insekticide. Kontaktini insekticid mora pasti na štetnika kako bi ga uništio. Takva sredstva nisu dosta djelotvorna na štetnike koji se nalaze ispod lišća, npr. lisne uši. Zbog toga lisne uši suzbijamo sistemskim insekticidima koji ulaze u list a uši ugibaju sišući zatrovani sok lista. U Tablici broj 1. nalaze se svi sistemski insekticidi registrirani u RH. Možda nisu navedeni neki najnoviji. Sigurno da ni jedna poljoapoteka nema sve preparate, no ako nabavite bilo koji s ovog popisa, nećete pogriješiti. Kao što je iz tablice vidljivo, neki sistemski insekticidi djeluju i na gusjenice pa čak i na kornjaše (ružičare, zlatne mare i pipe), no za ovu skupinu štetnika sigurno su efikasniji insekticidi iz grupe sintetskih piretroida. To jes skupina otrova visoke insekticidnosti, koriste se u vlo niskim dozama te imaju vrlo širok spektar djelovanja. Popis sintetskih piretroida imate u tablici br.2. I da rezimiramo; lisne uši suzbijamo sistemskim insekticidima a "tvrde kukce" – kornjaše sintetskim piretroidima.

Osim ovih štetnika koje većina ljudi raspoznaje, postoje i štetnici koji su manje vidljivi a znaju napraviti dosta štete. Prvi je trips ili dlakavi rešičar koji radi štete na cvijetu dok je još u fazi pupoljka. Pup se sporo otvara a kad se počinje otvarati ostaje kao zapečen i deformiran. Trips je u ružama stalno prisutan a veće štete radi u stakleničkoj proizvodnji. Lako ga možemo vidjeti potrgamo li poluotvoreni cvijet u unutrašnjosti cvijeta. Vrlo je sitan – 0,5-1 mm. Zaštitna sredstva kojima suzbijamo lisne uši djeluju i na trips a preporučamo suzbijanje samo kod jačeg napada.

Uz trips manje vidljivi štetnik je i crveni pauk. Možemo ga vidjeti samo povećalom a također je značajniji štetnik u stakleničkoj proizvodnji i rijetko ga se mora vani suzbijati. Za crvenog pauka koristi se posebna skupina insekticida – akaricidi. U Hrvatskoj su registrirani: Demitan, Ortus, Vertimec, Kraft, Zoom... Štete vidimo na mlađem lišću u vidu žućenja a povećalom na naličju lista možemo naći sitnog štetnika crvene boje. Također ne preporučamo preventivna tretiranja u vrtovima i ružnjacima. Prskati kod jačeg napada.

Daleko veće probleme i štete na ružama od štetnika mogu nam napraviti bolesti ruža. Tri najvažnije bolesti na ružama su:

- pepelnica – *Spaerotheca pannosa*
- crna pjegavost – *Marssonina rosae*
- hrđa – *Phragmidium mucronatum*

Ovisno o vremenskim uvjetima tijekom ljeta, nekad se više javlja pepelnica dok drugi put pjegavost ili rđa.



Zaštita ruža

Pepelnica se javlja u vidu bijele brašnaste prevlake na listovima i pupoljcima. Listovi se smežuraju i počnu prerano opadati. Zarazi pogoduju neprozračni položaj, nedostatak vlage u tlu, manjak hranjiva te vrući dani iza kojih dolaze hladne noći.

Crna pjegavost se širi još brže od pepelnice i teško je suzbijamo kad se već pojavi. Simptomi su crne mrlje sa žutim rubovima. Pogoduje joj vruće i vlažno vrijeme tijekom srpnja i kolovoza. I dok se pepelnica javlja na vršnim listovima, pjegavost se počinje širiti od donjih listova.

Hrđa nije česta bolest, ali kad zahvati biljku, može prouzročiti defolijaciju kao i pjegavost. Prepoznamo je po narančastim nakupinama na naličju listova. Zarazu ruža ovom bolesti pospješuje hladno proljeće iza kojeg slijedi suho ljeto.

Od ostalih bolesti, ruže mogu napasti i peronospora, rak, venuće mladica, purpurna pjegavost, viroze, bakterijska palež, no javljaju se vrlo rijetko te u pravilu nisu uzrok većih problema sa zdravljem ruža.

Danas teško možemo uzgojiti zdrave ruže bez prskanja, tj. bez zaštite od navedenih bolesti. Postoji dosta preparata koje možemo nabaviti u našim poljoapotekama, (Tablica 3). Jedini problem je u tome što ima malo preparata koji djeluju na sve tri bolesti. Pa čak i takvi obično imaju slabije djelovanje na jednu od njih.U tablici br.3 navedena je većina fungicida koji se mogu kod nas nabaviti. za zaštitu ruža od bolesti. Kod zaštite ruža od bolesti moramo se pridržavati nekoliko pravila:

- program zaštite počinje kad crvena boja izboja i listova prelazi u zelenu -svibanj
- u početku koristimo kontaktna sredstva a kasnije; 7. i 8. mjesec sistemična
- kombinacija preparata koju koristimo mora djelovanjem pokrivati sve tri bolesti
- prskamo svakih 10-14 dana s tim da za vrijeme visokih temperatura i velike vlage u zraku ni to nije dovoljno
- bakar (Cuprablau) je dobar preparat no ne preporučamo ga s ničim miješati. Dobro bi bilo koristiti ga samog kao međuprskanje u programu zaštite
- zbog glatke površine lista dobro je miješati i okvašivač (Tensiofill) radi boljeg ljepljenja preparata na list.

Ukoliko nam se u međuvremenu jave i štetnici na ružama, možemo u koktel kojim prskamo staviti i insekticid. Ukoliko želimo folijarno prihraniti ruže, možemo i gnojivo staviti zajedno s fungicidima. No naša je preporuka da to radimo odvojeno jer što više kemikalija miješamo, to postoji veća opasnost od neželjenih kombinacija kojima možemo oštetiti ruže.



Tablica br. 1 – sistemični insekticidi

R.BR.	PRIPRAVCI	DJELATNA TVAR	KONCENTRACIJA ŠKROPIVA - %	DJELOVANJE
1.	ROGOR, CHROMGOR, CALINOGOR, RITAM, ZAGOR, PERFEKTHION	DIMETOAT	0,05-0,15	UŠI, GUSJENICE
2.	PIRIMOR	PIRIMIKARB	0,04-0,06	UŠI
3.	CONFIDOR, BOXER, CONGO, DALI, KOHINOR, MAGNUM, RAPID	IMIDAKLOPRID	0,025-0,1	UŠI, GUSJENICE, KORNJAŠI
4.	ACTARA	TIAMETOKSAM	0,016-0,02	UŠI, GUSJENICE, KORNJAŠI
5.	CALYPSO, PROTEUS	TIAKLOPRID	0,01-0,03	UŠI, GUSJENICE, KORNJAŠI
6.	MOSPILAN, ACELAN, WIZZZAARD, VOLLEY	ACETAMIPRID	0,025-0,035	UŠI, GUSJENICE, KORNJAŠI
7.	CHESS	PIMETROZIN	0,04	UŠI
8.	MAVRIK	TAU-FLUVALINAT	0,02	UŠI
9.	TEPEKI	FLONIKAMID	0,012-0,014	UŠI

Tablica br. 2 – sintetski piretroidi- insekticidi za suzbijanje raznih kornjaša na ružama

R.BR.	PRIPRAVCI	DJELATNA TVAR	KONCENTRACIJA ŠKROPIVA - %	DJELOVANJE
1.	CHROMOREL	CIPERMETRIN	0,075-0,15	IMAJU VRLO ŠIROK SPEKTAR DJELOVANJA; DLAKAVI RUŽIČARI, SJAJNE BUBE, SKAKAVCI, PIPE KAO I NA GUSJENICE TE LISNE I ŠTITASTE UŠI DOK TALSTAR DJELUJE I NA CRVENOG PAUKA
2.	FASTAC, DIREKT, ALFA, FASCON	ALFA-CIPERMETRIN	0,015-0,025	
3.	DECIS, SKUD, ROTOR, DECIDE	DELTAMETRIN	0,04-0,06	
4.	SUMIALFA	ESFENVALERAT	0,02-0,03	
5.	VANTEX	GAMA- CIHALOTRIN	0,004-0,005	
6.	KARATE, KAISO KARIS, LAMBDA	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02-0,04	
7.	BETA BAYTROID	BETA CIFLUTRIN	0,03-0,05	
8.	TALSTAR	BIFENTRIN	0,02-0,05	

Tablica br. 3 – fungicidi – sredstva za suzbijanje najvažnijih bolesti na ružama

PRIPRAVCI	DJELATNA TVAR	KONC. %	DJELOVANJE NA BOLESTI			VRSTA FUNGICIDA	NAPOMENA
			PEPELNICA	PJEGAVOST	RDA		
CUPRABLAU CHAMPION NORDOX KOCIDE	BAKAR	PREMA UPU-TAMA		+	+	KONTAKTNI	NE MIJEŠAJU SE S OSTALIM FUNGICIDIMA I INSEKTICIDIMA
SUMPOR SC CHROMOSUL THIOVIT	SUMPOR	0,4	+	+		KONTAKTNI	KOD VELIKIH VRUČINA IZAZIVA PALEŽ LISTA
KARATHANE GOLD SABITHANE	DINOKAP	0,06	+	+		KONTAKTNI	KOD VELIKIH VRUČINA IZAZIVA PALEŽ LISTA
ANTRACOL, CHROMONEB	PROPINEB	0,2		+	+	KONTAKTNI	
DITHANE, STAR, MANKOZEB, MANKONOR, CADILLAC, CAIMAN, CRITTOX	MANKOZEB	0,35		+	+	KONTAKTNI	
POLYRAM	METIRAM	0,25		+	+	KONTAKTNI	
CAPTAN, MERPAN	CAPTAN	0,2-0,3		+	+	KONTAKTNI	
QUADRIS, ORTIVA, AMISTAR	AZOKSISTROBIN	0,1	+	+	+	SISTEMICI	
BAYCOR	BITERTANOL	0,05-0,1	+	+	+	SISTEMIK	
FOLICUR, MYSTIC, FOLIAR	TEBUKONAZOL	0,075	+	+	+	SISTEMICI	
SYSTHANE FOND	MIKLOBUTANIL	0,03	+	+	+	SISTEMICI	
DOMARK	TETRAKONAZOL	0,07	+	+	+	SISTEMIK	



Rasadnik ruža · Novo Selo Podravsko · vl. Ivan Virag · Tina Ujevića 17, 42 230 Ludbreg
tel/fax: 042 810 176 · gsm: 091 562 8802 · e-mail: ivan.virag@vz.t-com.hr

TIVATISKARA