

Zemlja zna zahvaliti

Nahranite svoje masline novom generacijom vrhunskih folijarnih gnojiva YaraVita Mediterano i one će vam uzvratiti vrhunskim prinosom



Yara predstavlja novu generaciju folijarnih gnojiva YaraVita, koja u sebi sadrže poboljšivače usvojivosti, prijemčivosti, natopljenosti, suspenzije čime je osiguran unos i iskorištenost dodanih hranjiva putem lista. Ujedno su YaraVita jedna od najkoncentriranijih folijarnih gnojiva na tržištu, što ih čini ekonomski izrazito povoljnim, jer jednom litrom YaraVita gnojiva dodajemo puno veću količinu čistog hranjiva od većine proizvoda na tržištu.

Novo gnojivo u liniji YaraVita za sve mediteranske kulture s osobitom preporukom za masline je YaraVita Mediterano

Tehnologija ishrane masline:



	Osnovna gnojidba u proljeće	početak cvatnje	Plodovi veličine glave šibice	Stvaranje koštice	Promjena boje ploda	Nakon berbe
YaraMila™	Complex ili Cropcare 200-350 kg/ha					
YaraLiva™		NitraBor 100-200 kg/ha				
YaraVita™		Bortrac 1-3 lit/ha	Bortrac 1-3 lit/ha			Bortrac 2-3 lit/ha
YaraVita™		Mediterano 5 l/ha				Mediterano 5 l/ha
Albatros™		Standard 3 kg/ha		Albatros Hydro 2-3 kg/ha U razmacima od 10 do 14 dana		



YaraVita Mediterano

(N, P, Mg, B, Zn)

YaraVita Mediterano je kombinacija najvažnijih hranjiva za poboljšanje cvatnje kod većine mediteranskog voća i povrća. Sadrži značajnu količinu magnezija, bora i cinka, te je idealan za aplikaciju prije cvatnje, da poboljšamo cvatnju i oplodnju, kao i za primjenu nakon berbe voćaka, da pojačamo koncentraciju mikro elemenata u voćkama za sljedeću sezonu.

Primjena: 5-10 lit/ha na maslinama, u voćnjacima, vinogradima, plodovitom voću i povrću prije cvatnje.

Višegodišnja ispitivanja pokazala su da jednim tretmanom 5 do 10 lit/ha nakon berbe, a prije opadanja listova osiguravamo biljci zalihu potrebnih hranjiva za sljedeću sezonu, te joj time omogućavamo siguran i zdrav porast u sljedećoj sezoni.

Današnje moderno tržište zahtjeva i drugačiji pristup kultivaciji i ishrani masline što obuhvaća; analizu tla i listova, gnojdbu putem navodnjavanja (fertirigacija) te folijarnu gnojdbu koja je integralna, ciljana i trenutna.

Folijarna gnojdba postaje sve važnija u ishrani masline, i iako ne može zamijeniti uobičajeno gnojdbu putem korijenja, često može biti uključena u ishranu, kao dopunska gnojdba, kao izrazito jeftina u odnosu na rezultat koji njome postizemo.

Sa ciljanom folijarnom gnojidbom, temeljenoj na specifičnim proizvodima kao što su makro i mikro elementi neophodni za fiziološke procese u biljci, možemo postići više nego zadovoljavajuće rezultate uz relativno male troškove, te značajno povećati prinos.

Yara preporuča, uz osnovnu gnojdbu masline NPK gnojivima (YaraMila Complex 0,7-1,5 kg/stablu) i standardnu prihranu dušikom (YaraLiva NitraBor 0,5-0,8 kg/stablu) novo YaraVita folijarno gnojivo YaraVita Mediterano.

Distributer:

Colić – trade d.o.o. Radovanova 12, 23210 Biograd, tel. 023 662 109, fax. 023 662 685
Vrtni centar, Kakma b.b., 23423 Polača, www.colic-trade.com

YaraVita Mediterano sadrži

Dušik - među hranjivim elementima dušik ima jednu od najvažnijih uloga.

Stimulira vegetativni rast, te pomaže usvajanje drugih hranjivih elemenata. Najveće zahtjeve za dušikom maslina ima u fazi cvatnje, do okoštavanja sjemenki, pa ga u toj fazi moramo dodavati prihranom

Fosfor - ključno hranjivo za razvoj cvjetova i formiranje plodova.

Fosfor primijenjen putem lista izrazito je važan na tlima sa visokim pH, sa visokim udjelom kalcijevog karbonata, kao i na plitkim, siromašnim tlima ili u mladim, navodnjavanim maslinicima

Magnezij - hranjivo koje je neophodno za fotosintezu, kao i za mnoge važne enzimske procese u biljci. Bez dovoljno magnezija nema dobre fotosinteze a time niti dobrog i kvalitetnog prinosa ploda i ulja

Bor - jedna od neizostavnih mjera u masliniku je tretiranje masline prije cvatnje preparatima koji sadrže Bor (ako je zabilježen manjak u tlu može se dodati i čisti Bor sa YaraVita Bortrac-om 11%B). Folijarna primjena Bora dovodi do povećanja oplodnje te reducira broj nesavršenih cvjetova. Najbolji rezultati dobiveni su primjenom bora u dva navrata:

- * u početku cvatnje maslina (kad je otprilike 5% cvjetova otvoreno)

- * tretiranje kad je plod masline veličine glave šibice

Cink - važan za sprječavanje opadanja plodova kao i za povećanje sadržaja ulja u plodovima.

Također pomaže u smanjenju stresa uzrokovanog intenzivnim sunčevim svjetlom, sušom i vrućinom.

Najučinkovitija primjena cinka je prije cvatnje