

**PROIZVODNI
PROGRAM
2024.**

NOVAG
AGROCHEMICALS

PROFESIONALNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, DERATIZACIJU I DEZINSEKCIJU

HERBICIDI

- BONACA
- FUSILADE FORTE
- MURAL
- TALISMAN
- DUOPACK-TALISMAN+MURAL 2ha
- TOTAL SUPER
- ZAMZAR
- SCORPIO 70 WG

INSEKTICIDI

- KOFUMIN 308 EC
- SHERPA 100 EW
- DIREKT GREEN
- MOSPILAN 20 SG
- NISSORUN 10 WP
- NISSORUN PLUS
- PICADOR 1,6 MG
- CUMBO 0,8 MG
- HARPUN
- ZLATICA DUOPACK

FUNGICIDI

- KALINOSUL 80 WG
- MAGMA TRIPLE
- QUIMERA
- AVALON

MINERALNA ULJA

- PROMANAL NEU
- MODRO ULJE

SREDSTVA ZA DEZINSEKCIJU

- NEOPITROID ALFA
- NEOPITROID PREMIUM PLUS

SREDSTVA ZA DERATIZACIJU

- BRODILON MEKI MAMAC
- BRODILON MAMAC
- BRODILON BLOK
- MYTHIC GEL

AMATERSKA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, DERATIZACIJU I DEZINSEKCIJU - BEZ VJERODAJNICE

HERBICIDI

- TOTAL SUPER

INSEKTICIDI

- DIREKT GREEN
- MOSPILAN 20 SP
- NISSORUN 10 WP

FUNGICIDI

- KALINOSUL 80 WG
- BRIMFLO - TEKUĆI SUMPOR
- AVALON

MINERALNA ULJA

- MODRO ULJE
- SREBRNO ULJE

SREDSTVA ZA DEZINSEKCIJU

- NEOPITROID ALFA
- NEOPITROID ALFA TOP 1,5
- NEOPITROID PREMIUM PLUS
- NEOPITROID prah PRO
- NEOPITROID B - spreman za upotrebu
- NEOPITROID OMEGA - spreman za upotrebu

SREDSTVA ZA DERATIZACIJU

- BRODILON DIF HOME BLOK
- BRODILON DIF HOME MEKI MAMAC
- BRODILON DERATIZACIJSKO LJEPIL

EKOLOŠKO ORGANSKO GNOJIVO

- EKO FERTIL

PROFESIONALNA

SNAGA U

AMATERSKOM

PAKIRANJU!

PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILJA, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

HERBICIDI

- BONACA 2
- FUSILADE FORTE 3
- MURAL 4
- TALISMAN 5
- DUOPACK - TALISMAN+MURAL PACK 5
- TOTAL SUPER 6
- ZAMZAR 7
- SCORPIO 70 WG 8

INSEKTICIDI

- KOFUMIN 308 EC 9
- SHERPA 100 EW 10
- DIREKT GREEN 11
- MOSPILAN 20 SG 12
- MOSPILAN 20 SP 13
- NISSORUN 10 WP 14
- NISSORUN PLUS 15
- PICADOR 1,6 MG 16
- CUMBO 0,8 MG 17
- HARPUN 18
- ZLATICA DUOPACK 19

FUNGICIDI

- KALINOSUL 80 WG 20
- BRIMFLO 21
- MAGMA TRIPLE 22

QUIMERA

- AVALON 23

MINERALNA ULJA

- PROMANAL NEU 24
- MODRO ULJE 25
- SREBRNO ULJE 26

DEZINSEKCIJA

- NEOPITROID ALFA 27
- NEOPITROID ALFA TOP 1.5 28
- NEOPITROID PREMIUM PLUS 29
- NEOPITROID PRAH PRO 30
- NEOPITROID B 31
- NEOPITROID OMEGA 32

DERATIZACIJA

- BRODILON DIF HOME BLOK 33
- BRODILON DIF HOME MEKI MAMAC 34
- BRODILON DERATIZACIJSKO LJEPIL 35
- BRODILON MEKI MAMAC 36
- BRODILON MAMAC 37
- BRODILON BLOK 38
- MYTHIC GEL 39

EKOLOŠKO ORGANSKO GNOJIVO

- EKO FERTIL 40

BONACA

HERBICID

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih vrsta višegodišnjih širokolisnih korova na površinama pod ozimom pšenicom i ozimim ječmom.

DJELATNA TVAR

Fluroksipir: 250 g/L (u obliku fluroksipir-meptila, 360 g/L)

Kulture u kojima se primjenjuje: ozima pšenica, ozimi ječam

Upotreba:

Primjenjuje se u fenološkoj fazi od faze dva razvijena lista do pojave jezička zadnjeg lista.

Suzbija ljepljivu broćiku (*Galium aparine*), mišjakinju (*Stellaria media*) i poljski slak (*Convolvulus arvensis*), te smanjuje zakorovljenost povijajućom heljdom (*Fallopia convolvulus*) i bršljanolisnom čestoslavicom (*Veronica hederifolia*).

Doza primjene: 0,6 - 0,8 L/ha

PAKIRANJE 1 L



Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u voćnjacima, vinovoj lozi, ratarskim kulturama, povrću, ukrasnom bilju i šumarstvu.

DJELATNA TVAR

Fluazifop-P 150 g/L

Zbog svoje selektivnosti i učinkovitosti spada među najprodavanije graminicide na svijetu.

Kulture u kojima se primjenjuje: pastirnjak, cikla, hren, repa, artičoka, lan, soja, ozima uljana repica, šećerna repa, stočna repa, luk, češnjak, luk kozjak, patlidžan, grah, grašak s mahunom, grašak (svježi bez mahune), bob, leća, slanuta, ukrasno bilje, konoplja, naranča, limun, klementina, grejp, tangerina, mandarina, kumkvat, badem, lijeska, orah, kesten, brazilski orah, indijski oraščić, makadamija, pekan orah, pistacija, jabuka, kruška, dunja, trešnja, višnja, breskva, nektarina, marelica, šljiva, smokva, maslina (stolne i uljne sorte), kivi, pošumljavanje šuma, vinova loza (vinske i stolne sorte), malina, kupina, mrkva, salata, matovilac, vrtna grbica, rikola, maslačak, špinat, tušt, blitva, šparoga, peršin za list, krastavac, đurđica, uljna tikva.

Upotreba:

U velikom broju povrtnih, ratarskih kultura, vinovoj lozi, voćnjacima, ukrasnom bilju i šumarstvu

Sredstvo dobro suzbija:

- jednogodišnje uskolisne vrste koje većinom niču u jesen:

FUSILADE FORTE

HERBICID

mišji repak (*Alopecurus sp.*), slakoperka (*Apera spica venti*), divlja zob (*Avena fatua*) i druge vrste zobi (*Avena sativa*, *Avena sterilis*, *Avena sp.*), ovsik sterilni (*Bromus sterilis*), stoklas (*Hordeum murinum*), samonikle žitarice: ječam, pšenica, pšenoraž i raž;

- jednogodišnje uskolisne vrste koje većinom niču u proljeće: svračice (*Digitaria sanguinalis*, *Digitaria ischaemum*, *Digitaria sp.*), koštan (*Echinochloa crus-galli*), (*Echinochloa colonum*), prosa (*Panicum miliaceum*, *Pennisetum glaucum*), muharike (*Setaria pumila*, *Setaria verticillata*, *Setaria viridis*, *Setaria sp.*); - višegodišnje uskolisne korovne vrste (0,8 - 1,7 L/ha): ljuljevi (*Lolium multiflorum*, *Lolium perenne*, *Lolium rigidum*, *Lolium sp.*);

- višegodišnje uskolisne korovne vrste (1,7 - 2,5 L/ha): pirika (*Agropyron repens*), troskot (*Cynodon dactylon*), divlji sirak (*Sorghum halepense*).

Doza primjene: 0,8 - 2,5 L/ha

PAKIRANJE 1 L, 5 L

MURAL

HERBICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



Selektivni translokacijski herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu, u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

DJELATNA TVAR
480 g/L Dikamba

MURAL® je veoma efikasan u suzbijanju tvrdokornih višegodišnjih korova kao što su poljski slak (*Convolvulus arvensis*) i poljski osjak (*Cirsium arvense*).

Kulture u kojima se primjenjuje: kukuruz za zrno i silažu

Upotreba:
nakon nicanja, kada kukuruz razvije 2 - 5 listova (faze 12 - 15 BBCH skale), a korovi su u fazi 2 - 6 lista (faze 12 - 16 BBCH skale).

Kako bi se povećala efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova, preporučuje se miješanje sa preparatom TALISMAN® (nikosulfuron 40 g/L).

Doza primjene: 0,6 - 0,75 L/ha

PAKIRANJE 1 L, 5 L

Selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD) koja omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usvajanje djelatne tvari.

DJELATNA TVAR
40 g/L Nikosulfuron

Kulture u kojima se primjenjuje: kukuruz za zrno i silažu.

Upotreba:
poslije nicanja (post-em).

Doza primjene: 1 - 1,5 L/ha

PAKIRANJE 1 L

DUOPACK - TALISMAN + MURAL PACK

BEST BUY! Najpovoljnija kombinacija na tržištu

Kombinacija za suzbijanje korova na 2 ha kukuruza (1 L MURALA i 2 L TALISMANA)

TALISMAN

HERBICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



TOTAL SUPER

HERBICID

PROFESIONALNA

AMATERSKA

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u voćarstvu, ratarstvu, šumarstvu, površarstvu, rasadnicima, ukrasnom bilju te neobrađenim i nepoljoprivrednim površinama.

DJELATNA TVAR
Glifosat 360 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: limun, naranča, mandarina, grejp, jabuka, kruška, orah, lijeska, maslina, marelica, trešnja, nektarina, breskva, šljiva, badem, kivi, cvijeće (na otvorenom), ukrasno bilje (na otvorenom), šumski nasadi (na otvorenom), rasadnici topola (na otvorenom), mrkva (na otvorenom), krumpir (na otvorenom), ruža (na otvorenom), obnova travnjaka koji nisu javne površine, jagoda na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), artičoka na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), rajčica na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), patlidžan na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), grah na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), bob na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), grašak na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), mrkva na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), krumpir na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), šećerna repa na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, pšenica na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, ječam na

nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, raž na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, zob na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, kukuruz na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, lan na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, gorušica na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), uljana repica na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, suncokret na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, pamuk na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja, livade koje nisu javne površine na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom), rasadnik prije sjetve (čak i u tehnikama reducirane obrade ili sadnje bez oranja) (na otvorenom), uz autoceste, uz željezničke pruge.

Upotreba:

TOTAL SUPER je herbicid namijenjen suzbijanju korova u predsjetvenoj obradi, prije nicanja usjeva, na strništima, u voćnjacima i vinogradima, na neobrađenom poljoprivrednom zemljištu, u šumama i rasadnicima te na željezničkim prugama. TOTAL SUPER je neselektivni, sistemski herbicid za potpuno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova (zeljastih i drvenastih), uključujući i korove s dubokim korijenom (gomolji, rizomi). TOTAL SUPER biljka upija preko svih zelenih dijelova i svježeg reza drveća. Izuzetak su četinječe u fazi potpunog mirovanja vegetacije i odrvenjela kora drveća.

Doza primjene: 1,5 - 12,0 L/ha

PAKIRANJE 250 ml (AM), 1 L, 20 L (PRO)

Zamzar je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu.

DJELATNA TVAR
Kizalofop-P 50 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: suncokret, uljana repica.

Upotreba:

Suncokret za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova od stadija razvijena 3 lista do stadija 9 ili više izduženih internodija stabljike (BBCH 13-39).

Uljana repica za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova od stadija razvijena 3 lista do stadija 9 ili više izduženih internodija stabljike (BBCH 13-39).

Doza primjene: 1,2 - 3,0 L/ha

PAKIRANJE 1 L, 5 L

NAJPOVOLJNIJI GRAMINICID NA TRŽIŠTU

ZAMZAR

HERBICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



SCORPIO 70 WG

HERBICID

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih jednogodišnjih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

DJELATNA TVAR
Metribuzin 700 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: krumpir, rajčica, soja, lucerna.

Upotreba:

Krumpir: a) nakon sadnje a prije nicanja krumpira
b) nakon nicanja krumpira, kada krumpir dosegne visinu od 5 - 10 cm, odnosno nakon što razvije 5 - 8 listova.

Rajčica: tretirati 8 - 10 dana nakon presađivanja.

Soja: a) nakon sjetve a prije nicanja soje
b) zbog potpunijeg djelovanja na korove u sušnim područjima sredstvo se može prijeniti u dva tretiranja; 1- prvo tretiranje - prije sjetve soje, uz inkorporaciju, 2 - drugo tretiranje - nakon sjetve, a prije nicanja.

Lucerna: primjeniti u vrijeme zimskog mirovanja, samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni.

Doza primjene: 0,5 - 1,5 kg/ha

PAKIRANJE 1 kg



Kontaktno-želučani insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama na kojima je odobrena primjena u skladištu ili u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena.

DJELATNA TVAR
Cipermetrin 80 g/L + synergist Piperonil butoksid 228 g/L

Upotreba:

KOFUMIN 308 EC je preventivni i kurativni insekticid, kontaktnog i želučanog djelovanja za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (*Sitophilus spp.*), žitnog kukuljičara (*Rhyzopertha dominica*), brašnara (*Tribolium spp.*), surinamskog brašnara (*Oryzaephilus surinamensis*) i dr. na pšenici, ječmu, raži, zobi, pšenoraži i piru nakon žetve, a pri unošenju u skladište ili u praznim skladištima.

Sredstvo KOFUMIN 308 EC se primjenjuje:

- na žitaricama na kojima je odobrena primjena prije uskladištenja
- u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena

Doza primjene: 10 - 20 ml/480 ml vode na tonu žitarica ili 60 ml/5 L vode za 100 m²

PAKIRANJE 100 ml

KOFUMIN 308 EC

INSEKTICID



SHERPA 100 EW

INSEKTICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



SHERPA 100 EW je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu, povrćarstvu, industrijskom i ukrasnom bilju te na pašnjacima.

DJELATNA TVAR
Cipermetrin 100 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam, ozima i jara uljana repica, krumpir, kupus, kelj pupčar, brokula, cvjetača, vinova loza (stolne i vinske sorte), lucerna, rajčica, pašnjaci, ukrasno zeljasto i drvenasto bilje na otvorenom.

Upotreba:

Suzbija veliki broj vrsta lisnih uši, krumpirovu zlaticu (*Leptinotarsa decemlineata*), kupusnu sovicu (*Mamestra brassicae*), kupusnog moljca (*Plutella xylostella*), kupusnog bijelca (*Pieris brassicae*), pepeljastog grožđanog moljca (*Lobesia botrana*), lozinog zelenog cvrčka (*Empoasca vitis*), duhanovog štitastog moljca (*Bemisia argentifolii*) i cvjetnog štitastog moljca (*Trialeurodes vaporariorum*).

Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije.

Doza primjene: 0,25 - 0,3 L/ha

PAKIRANJE 250 ml, 1 L, 5 L

DIREKT GREEN je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu.

Dozvoljena je primjena u ekološkoj poljoprivredi.
Insekticid kratke karence.

DJELATNA TVAR
Piretrini 40 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: breskva, marelica, nektarina, šljiva, trešnja, vinova loza (stolne i vinske sorte), dinja, rajčica, salata, tikva, lubenica, patlidžan, paprika, krastavac, tikvica, matovilac, špinat.

Suzbija:

- zelenu breskvinu uš (*Myzus persicae*) na koštićavom voću
- američkog cvrčka (*Scaphoideus titanus*) i cvrčka (*Zygina rhamni*) na vinovoj lozi.
- duhanovog štitastog moljca (*Bemisia tabaci*) i stakleničkog štitastog moljca (*Trialeurodes vaporariorum*) na dinji, tikvi, rajčici, patlidžanu, paprici, krastavcu.
- salatinu lisnu uš, (*Nasonovia ribisnigri*), pamukovu lisnu uš (*Aphis gossypii*) i crnu repinu (bobovu) uš (*Aphis fabae*) na salati, matovilcu i špinatu.

Doza primjene: 75 - 90 ml/100 L vode

PAKIRANJE 100 ml (AM), 1 L (PRO)

DIREKT GREEN

INSEKTICID



PROFESIONALNA

AMATERSKA

MOSPILAN 20 SG

INSEKTICID

MOSPILAN 20 SG je sistemični insekticid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca.

DJELATNA TVAR
Acetamiprid 200 g/kg

Dozvoljena primjena u velikom broju voćnih, ratarskih, industrijskih te povrtnih i začinskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Uništava veliki broj štetnih insekata.

Kulture u kojima se primjenjuje: kukuruz, uljana repica, uljana rotkva, krumpir, duhan, paprika (u zaštićenom prostoru), rajčica (u zaštićenom prostoru), patlidžan (u zaštićenom prostoru), krastavac (u zaštićenom prostoru), tikvice (u zaštićenom prostoru), kelj pupčar, začinsko bilje, ukrasno bilje (na otvorenom), jabuka, kruška, trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina, naranča, mandarina, limun, grejp, rasadnik agruma, dinja, lubenica, zelena salata, kupus, cvjetača, brokula.

Doza primjene: 60 - 500 g/ha

PAKIRANJE 200 g, 1 kg

Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu, industrijskom bilju, povrćarstvu u zaštićenom prostoru te ukrasnom bilju na otvorenom.

DJELATNA TVAR
Acetamiprid 200 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: višnja, šljiva, trešnja, koštičavo voće, jabuka, jezgričavo voće, mak, uljana repica, suncokret, krumpir, hmelj, paprika (u zaštićenom prostoru), rajčica (u zaštićenom prostoru), krastavac (u zaštićenom prostoru), ukrasno bilje (na otvorenom).

Suzbija:

- jabučnog savijača
- lisne uši
- jabučnu krvavu uš
- maraskinog svrdlaša
- trešnjinu muhu
- kalifornijsku štitastu uš
- repičinog sjajnika
- male i velike repičine pipe
- krumpirovu zlaticu i dr.

Doza primjene: 60 - 250 g/ha

PAKIRANJE 2,5 g, 50 g

MOSPILAN 20 SP

INSEKTICID

AMATERSKA PRIMJENA



NISSORUN 10 WP

INSEKTICID

PROFESIONALNA

AMATERSKA



NISSORUN 10 WP je akaricid s kontaktnim i želučanim načinom djelovanja namijenjen suzbijanju štetnih grinja u voćarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu.

DJELATNA TVAR
Heksitiazoks 100 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: jabuka, kruška, vinova loza (vinske i stolne sorte), rajčica (u zaštićenom prostoru), paprika (u zaštićenom prostoru), patlidžan (u zaštićenom prostoru), krastavac salatni (u zaštićenom prostoru), krastavac za preradu (u zaštićenom prostoru), tikvica (u zaštićenom prostoru), dinja (u zaštićenom prostoru), lubenica (u zaštićenom prostoru), bundeva (u zaštićenom prostoru).

Upotreba:
Primjenjuje se za suzbijanje crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*) i koprivine grinje (*Tetranychus urticae*).

Doza primjene: 50 - 80 g/100 L vode odnosno 0,5 - 0,8 kg/ha

PAKIRANJE 50 g (AM), 500 g (PRO)

Akaricid namijenjen suzbijanju štetnih grinja u voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu.

DJELATNA TVAR
Heksitiazoks 31.2 g/L, Fenpiroksimat 62.4 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: rajčica (na otvorenom), patlidžan (na otvorenom), vinova loza (vinske i stolne sorte), naranča, limun, mandarina, klementina, jabuka.

Suzbija:
Crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*) i koprivine grinje (*Tetranychus urticae*).

Doza primjene: 1,2 L/ha

PAKIRANJE 100 ml, 1 L

NISSORUN PLUS

INSEKTICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



PICADOR 1,6 MG

INSEKTICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu i krumpiru.

DJELATNA TVAR
Cipermetrin 16 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: kukuruz, sirak, krumpir, kukuruz šećerac.

Upotreba:
Za suzbijanje kukuruzne zlatice (*Diabrotica virgifera virgifera*), žičnjaka (*Agriotes spp.*) i sovica pozemljuša (*Agrotis spp.*).

Doza primjene: 12 kg/ha

PAKIRANJE 12 kg

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu, povrćarstvu, industrijskom bilju te na travnjacima i livadama.

DJELATNA TVAR
Cipermetrin 8 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: kukuruz za zrno, kukuruz šećerac, sirak, suncokret, mrkva (na otvorenom), cikla (na otvorenom), šećerna repa (na otvorenom), hren (na otvorenom), celer korjenaš (na otvorenom), pastrnjak (na otvorenom), peršin za korijen (na otvorenom), rotkva (na otvorenom), bijela repa (na otvorenom), koraba (na otvorenom), brokula (na otvorenom), cvjetača (na otvorenom), kupus (na otvorenom), kelj pupčar (na otvorenom), rajčica (na otvorenom), patlidžan (na otvorenom), krumpir (na otvorenom), češnjak (na otvorenom), luk (na otvorenom), luk kozjak (na otvorenom), dinja (na otvorenom), lubenica (na otvorenom), krastavac (na otvorenom), tikvica (na otvorenom), bundeva (na otvorenom), uljana repica, duhan (na otvorenom), pamuk, travnjaci, livade.


Upotreba:
za suzbijanje
- ličinka kukuruzne zlatice (*Diabrotica virgifera virgifera*)
- gusjenica sovica pozemljuša (*Agrotis sp.*)
- žičnjaka (*Agriotes spp.*)
- mrkvine muhe (*Psila rosae*)
- kupusne muhe (*Delia radicum*)
- lukove muhe (*Hylemyia antiqua syn. Delia antiqua*)
- repičinog crvenoglavog buhača (*Psylliodes chrysocephala*)
- običnog hrušta (*Melolontha melolontha*) i ličinka komara (*Tipula sp.*)

Doza primjene: 12 - 24 kg/ha

PAKIRANJE 12 kg

COLUMBO 0,8 MG

INSEKTICID



PROFESIONALNA PRIMJENA

HARPUN

INSEKTICID

Insekticid s ovicidnim i larvicidnim djelovanjem namijenjen suzbijanju štetnika u povrćarstvu i voćarstvu.

DJELATNA TVAR
Piriproksifen 100 g/L

Najbolja efikasnost se postiže kada se depozit preparata nanese na biljku prije polaganja jaja ili na svježe položena jaja (24 sata nakon polaganja).

Kulture u kojima se primjenjuje: rajčica (u zaštićenom prostoru), krastavac (u zaštićenom prostoru), jabuka, kruška.

Suzbija:

- stakleničkog štitastog moljca (*Trialeurodes vaporariorum*) na rajčici i krastavcima
- jabučnog savijača (*Cydia pomonella*) na jabuci
- kruškinu buhu (*Cacopsylla pyricola*) na krušci

Doza primjene: 75 ml/100 L vode ili 1L/ha u voćarstvu

PAKIRANJE 100 ml, 1 L



**ZLATICA DUOPACK za 1 ha
(250 ml Sherpa 100 EW + 200 g Mospilan SG)**

Provjerena kombinacija za učinkovito suzbijanje otpornih štetnika u krumpiru, repici, žitaricama, kupusnjačama, vinovoj lozi, rajčici.

Sistemično djelovanje acetamiprida iz Mospilan SG koje se nadopunjuje s kontaktnim i trenutnim djelovanjem cipermetrina iz Sherpa 100 EW.



ZLATICA DUOPACK

INSEKTICID

KALINOSUL 80 WG

FUNGICID

PROFESIONALNA

AMATERSKA

20



Kontaktни fungicid za suzbijanje pepelnica s popratnim akaricidnim djelovanjem na vinovoj lozi, voćkama, povrću, ukrasnom bilju i hmelju.

DJELATNA TVAR
Sumpor 800 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: povrtlarske kulture, vinova loza, jabuka, breskva, begonija, cinerarija, krizantema, hortenzija, ruža, hmelj.

Upotreba:

KALINOSUL 80 WG je preventivni fungicid u obliku močivih autodisperzivnih granula, ima zadovoljavajuće akaricidno djelovanje na grinje šiškarice (*Eryophidae*).

Suzbija:

- pepelnicu vinove loze (*Uncinula necator*)
- pepelnicu jabuke (*Podosphaera leucotricha*)
- pepelnicu breskve (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicaria*)
- pepelnicu hmelja (*Sphaerotheca humuli*)
- pepelnice (*Oidium spp.*) na povrtnim kulturama
- pepelnicu ruže (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae*)
- pepelnicu u drugom cvijeću (begonijama, cinerarijama, krizantemama i hortenzijama)

Doza primjene: 200 - 600 g/100 L vode

PAKIRANJE 1 kg (AM), 25 kg (PRO)

Tekući sumpor sa fungicidnim kontaktним preventivnim djelovanjem, te popratnim akaricidnim djelovanjem za suzbijanje pepelnice.

DJELATNA TVAR
Sumpor 800 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: vinova loza, jabuka, breskva, povrtlarske kulture (osim špinata), krastavac, grašak.

Upotreba:

- pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*)
- pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*)
- pepelnice breskve (*Sphaerotheca pannosa*)
- pepelnice na povrtlarskim kulturama (osim špinata) (*Oidium spp.*)

Doza primjene: 300 - 600 ml/100 L vode

PAKIRANJE 1 L



BRIMFLO TEKUĆI SUMPOR

FUNGICID

AMATERSKA PRIMJENA

21



MAGMA TRIPLE

FUNGICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



Fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu.

Kombinacija tri aktivne tvari koje se savršeno nadopunjuju te predstavljaju odlično rješenje za širok spektar bolesti vinove loze od početka vegetacije do sazrijevanja vinove loze.

DJELATNE TVARI

Fosetil 500 g, Folpet 250 g, Cimoksanil 40 g

Kulture u kojima se primjenjuje: vinova loza (vinske i stolne sorte).

Upotreba:

- za suzbijanje plamenjače (*Plasmopara viticola*)

Doza primjene: 3 kg/ha

PAKIRANJE 250 g, 1 kg, 3 kg

Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i maslinarstvu.

DJELATNA TVAR

Krezoksim metil 500 g/kg

Kulture u kojima se primjenjuje: jabuka, kruška, vinova loza, maslina.

Upotreba:

- krastavosti (*Venturia pyrina*) i smeđe pjegavosti (*Stemphylium vesicarium*) na kruški
- krastavosti (*Venturia inaequalis*) i pepelnice (*Podosphaera leucotricha*) na jabuci.
- na vinovoj lozi za suzbijanje pepelnice (*Uncinula necator*) i crne truleži (*Guingnardia bidwelli*),
- na maslini za suzbijanje paunovog oka (*Spilocaea oleagina*)

Doza primjene: 0,2 - 0,3 kg/ha

PAKIRANJE 20 g, 1 kg

QUIMERA

FUNGICID

PROFESIONALNA PRIMJENA



AVALON

FUNGICID

AVALON je sistemski fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

DJELATNA TVAR
Pirimetamil 400 g/L

Kulture u kojima se primjenjuje: luk (na otvorenom), breskva, nektarina, marelica, vinova loza (vinske i stolne sorte), jabuka, kruška.

Upotreba:

- siva grožđana plijesan (*Botrytis cinerea*)
- bijela trulež (*Sclerotium spp.*)
- siva plijesan (*Botrytis spp.*)
- smeđa trulež ploda (*Monilinia spp.*)
- krastavosti (*Venturia spp.*)

Doza primjene: 1,5 - 2,5 L/ha

PAKIRANJE 100 ml (AM), 1 L (PRO)



PROMANAL NEU je insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i povrćarstvu.

DJELATNA TVAR
Parafinsko ulje, 546 g/L

Kulture na kojima je dozvoljena primjena

naranča, mandarina, limun, klementina, jabuka, kruška, šljiva, nektarina, breskva, trešnja, marelica, krastavac, dinja, lubenica, paprika, rajčica, patlidžan, tikvica (u zaštićenom prostoru), cvjetača i brokula (na otvorenom)

Upotreba:

- za suzbijanje žute narančine štitaste uši (*Aonidiella aurantii*), crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*), jabučne zelene uši (*Aphis pomi*) i jabučne pepeljaste uši (*Dysaphis plantaginea*), zelene breskvine uši (*Myzus persicae*), crne trešnjina uši/trešnjine lisne uši (*Myzus cerasi*), lisne uši (*Hyalopterus spp.*), duhanovog štitastog moljca (*Bemisia tabaci*), stakleničkog štitastog moljca (*Trialetrodes vaporariorum*), kalifornijskog tripsa (*Frankliniella occidentalis*) i kupusnog štitastog moljca (*Aleyrodes proletella*).

Doza primjene: 1 - 2 L/100 L vode

Za cvjetaču i brokulu na otvorenom 3 - 10 L/ha

PAKIRANJE 1 L, 20 L

PROMANAL NEU

MINERALNO ULJE



MODRO ULJE

MINERALNO ULJE

PROFESIONALNA

AMATERSKA



Kombinirani insekticid-fungicid-akaricid namijenjen za zaštitu trajnih nasada.

DJELATNE TVARI

Bakar 100 g/L (iz bakrovog II hidroksida) i Mineralno ulje 550 g/L

Kulture na kojima je dozvoljena primjena: nasadi u mirovanju

Upotreba:

Primjenjuje se za suzbijanje:

- šljivine štitaste uši (*Lecanium corni*),
- zimskih jaja crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*)
- zimskih jaja lisnih ušiju (*Aphididae*)
- zimskih jaja kruškine buhe (*Psylla piri*)
- uzročnika kovrčavosti lišća breskve (*Taphrina deformans*)
- uzročnika šupljikavosti lišća koštićavih voćaka (*Stigmata carpophila*)
- pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (*Venturia spp.*)

Doza primjene: 2 - 3 L/100 L vode

PAKIRANJE 1 L (AM), 20 L (PRO)

Folijarno mikrognojivo s imunološkim i baktericidnim djelovanjem. Proizvod namjenjen za zimsku zaštitu i za primjenu tijekom sezone. Smanjuje potrebu za bakrenim preparatima.

Primjenjuje se za tretiranje sjemena i gomolja, presadnica i mladih biljaka, tretiranje tijekom vegetacije te za dezinfekciju alata i rezova na voćkama, grmlju i drveću.

Primjenjuje se u niskim dozama što pojednostavljuje primjenu.

DJELATNE TVARI

koloidno srebro 3000 mg/L + bor (B) 0.33% + bakar (Cu) 0.45% + cink (Zn) 0.8% + kobalt (Co) 0.03% + molibden (Mo) 0.1% + mangan (Mn) 0.8%

Kulture u kojima se primjenjuje: žitarice (pšenica, ječam, zob, raž), kukuruz, mahunarke (soja, grašak, grah), suncokret, uljana repica, šećerna repa, krumpir, rajčica, krastavac, paprika, patidžan, kupus, mrkva luk, jezgričavo voće, vinova loza, tikve, pamuk, riža, bobičasto voće, ukrasno bilje, cvijeće.

Upotreba:

- sprječava i kontrolira bolesti, nadoknađuje manjak mikronutrijenata i poboljšava njihovu bioraspoloživost za veliki broj biljaka
- koristi se za doradu sjemena i tretiranje vegetativnih dijelova biljaka.

Doza primjene: 0,2 - 4 L/ha ili 1%tna otopina za namakanje sjemena

PAKIRANJE 100 ml

SREBRNO ULJE

MINERALNO ULJE

NOVO!

AMATERSKA PRIMJENA



NEOPITROID ALFA

SREDSTVO ZA DEZINSEKCIJU

PROFESIONALNA

AMATERSKA



Kontaktни insekticid-biocid sa širokim spektrom djelovanja protiv velikog broja štetnika iz područja higijene, na mjestima gdje se čuvaju zalihe hrane i protiv ostalih oblika insekata. Zbog svoje formulacije jamči visoki učinak s niskom potrošnjom na svim vrstama površina. Vrlo brzo nakon uporabe nastaje tzv. »knock down« učinak.

DJELATNA TVAR

Alfa-cipermetrin (5.8%) nalazi se u obliku iznimno sitnih kristalnih čestica.

Preporuke za uporabu protiv različitih štetnika:

- leteći insekti
- žohari
- mravi
- stjenice
- buhe

Doza primjene: 25 ml/5 L vode za 100 m²

PAKIRANJE 100 ml (AM), 1 L (PRO)

Kontaktни insekticid-biocid sa širokim spektrom djelovanja protiv velikog broja štetnika iz područja higijene, na mjestima gdje se čuvaju zalihe hrane i protiv ostalih oblika insekata.

DJELATNA TVAR

Alfa-cipermetrin 1,58%

Upotreba

- Suzbijanje kukaca u gradskoj sredini (domaćinstva/kućanstva/privatne površine) - opća javnost
- Ruralna higijena (životinjske nastambe/skloništa) - osposobljeni profesionalci
- Ruralna higijena (životinjske nastambe/skloništa) - opća javnost

Ciljani organizmi:

- smeđi žohar - ličinke i odrasli
- crni mrav - odrasli
- komarac - odrasli
- osa - odrasli
- kućna muha - odrasli
- kućna stjenica - ličinke i odrasli

Doza primjene: 5 - 40 ml/1 L vode na 20 m²

PAKIRANJE 100 ml

NEOPITROID ALFA TOP 1,5

SREDSTVO ZA DEZINSEKCIJU

NOVO!



AMATERSKA PRIMJENA

NEOPITROID PREMIUM PLUS

SREDSTVO ZA DEZINSEKCIJU

PROFESIONALNA

AMATERSKA



Koncentrat za emulziju namjenjen za suzbijanje insekata pomoću ručnih prskalica, ULV aplikacije ili toplog zamagljivanja.

DJELATNA TVAR
Permetrin 11 %, Praletrin 0,5 %, Piperonil butoksid 12 % g/L

Upotreba:
Neopitroid Premium Plus je insekticid, posebno formuliran za razrjeđivanje s organskim otapalima (mineralno ulje, nafta i ostalo) ili vodom za primjenu u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni.

Neopitroid Premium Plus se primjenjuje na otvorenim prostorima za suzbijanje letećih štetnika (komaraca, muha, osa, stršljena i dr.), tretiranjem sa zemlje i iz zraka, te u zatvorenim prostorima za suzbijanje štetnika (žohara, mrava, stjenica, komaraca, muha, osa i dr.).

Doza primjene: ovisi o načinu primjene

PAKIRANJE 100 ml (AM), 1 L, 20 L (PRO)

Praškasti insekticid širokog spektra djelovanja, za brzu ručnu upotrebu.

DJELATNA TVAR
Permetrin 5 g/kg, Piperonil butoksid 5g/kg

NEOPITROID PRAH PRO - pokazuje izvrsnu učinkovitost u suzbijanju mrava, žohara i stjenica unutar 24 sata od aplikacije. Prvi rezultati se vide već nakon 5 minuta.

Upotreba:
- uspješno suzbija mrave, žohare, uši, buhe, grinje, krpelje, stjenice, skladišne štetnike i sl. Produljenog i dobrog početnog djelovanja. Ugodna mirisa. Koristi se za suzbijanje štetnika i nametnika u javnoj higijeni, veterini, kućanstvima, spremištima, nastambama. Upotrebljava se za ručno zaprašivanje iz prašilice.

PAKIRANJE 100 g

NEOPITROID PRAH PRO

SREDSTVO ZA DEZINSEKCIJU

AMATERSKA PRIMJENA



NEOPITROID B

SREDSTVO ZA DEZINSEKCIJU

NOVO!



Neopitroid B je biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj higijeni.

DJELATNE TVARI

Čisti ekstrakt Chrysanthemum cinerariaefolium dobiven iz otvorenih i zrelih cvjetova buhača (*Tanacetum cinerariifolium*) sa superkritičnim ugljičnim dioksidom 0,05% (w/w).

Ciljani organizami:

Puzajući insekti

- žohari: smeđi žohar (*Supella longipalpa*), njemački žohar (*Blattella germanica*), američki žohar (*Periplaneta americana*)
- mravi: crni mrav (*Lasius niger*), faraonski mrav (*Monomorium pharaonic*)
- srebrna ribica (*Lepisma saccharina*)
- smrdljivi martin (*Nezera viridula*)
- pauzi (*Pholocus phalangiodes*)

Leteći insekti

- komarci: azijski tigrasti komarac (*Aedes albopictus*), komarac (*Culex pipiens*)
- muhe: kućna muha (*Musca domestica*)
- ose: europska osa (*Vespa germanica*)

Doza primjene:

- 1 - 3 šprice (oko 2 ml) direktno na insekte
- 50 ml/m² za mrave, 75 ml/m² za žohare, srebrne ribice i smrdljive martine, 50 ml/m² za komarce, 75 ml/m² za kućne muhe

PAKIRANJE 500 ml

"SPREMAN ZA UPOTREBU" - POTPUNO PRIRODNA AKTIVNA TVAR

Neopitroid Omega je biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj higijeni.

DJELATNE TVARI

Acetamiprid 2 g/kg, D-tetrametrin 1 g/kg, Piperonil butoksid 4 g/kg

Upotreba:

NEOPITROID OMEGA je tekući insekticid spreman za upotrebu za suzbijanje gmižućih i letećih insekata.

Upotrebljava se za tretiranje u zatvorenim prostorima i na otvorenom za suzbijanje:

komaraca (*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*, *Aedes albopictus*), kućne muhe (*Musca domestica*), moljaca u hrani (*Ephesia kuehniella*, *Plodia interpunctella* (larvae)), moljaca na odjeći (*Tineola bisselliella*), buha (*Ctenocephalides felis*), paukova (*Tegeneraria domestica*), mrava (*Lasius niger*), žohara (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), grinja iz prašine (*Dermatophagoides farinae*, *D.pterronyssinus*), običnih stjenica (*Cimex lectularius*), insekata u štali (*Alphitobius diaperinus*, *Dermanyssus gallinae*, *Tribolium confusum*, *Dermestes maculatus*).

Doza primjene: 500 ml na 10 m² za zaštitu 50 m² prostora

PAKIRANJE 500 ml

"SPREMAN ZA UPOTREBU" NAJJAČI INSEKTICID NA TRŽIŠTU!

NEOPITROID OMEGA

SREDSTVO ZA DEZINSEKCIJU

NOVO!



BRODILON DIF HOME BLOK

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

BRODILON DIF HOME BLOK je mamac u obliku parafinskog bloka za deratizaciju.

DJELATNA TVAR
Difenacoum 0,025 g/kg

Upotreba:

BRODILON DIF HOME BLOK je specifično formuliran kruti mamac u obliku parafinskog bloka, ukusan glodavcima, a neprivlačan većini drugih neciljanih životinja, sa većim postotkom parafina što ga čini stabilnijim u vlažnim uvjetima.

PAKIRANJE 300 g



BRODILON DIF HOME MEKI MAMAC je mamac u obliku filter vrećica, posebno formuliran u svrhu maksimalizacije jestivosti.

DJELATNA TVAR
Difenacoum 0,025 g/kg

Upotreba:

BRODILON DIF HOME MEKI MAMAC je rodenticid na bazi difenacoum-a, izrađen od brašna u malim filter vrećicama. Zbog dodanih ulja, ostaje vrlo dugo sočan i djelotvoran. Vrlo je učinkovit u suzbijanju svih vrsta štetnih glodavaca, kao što su sivi i crni štakor, te poljski i kućni miš. Gorka tvar dodana u mamac djeluje odbojno za gutanje i učinkovito sprječava hranjenje neciljanih životinja, kao i ljudsku zlouporabu.

PAKIRANJE 150 g



BRODILON DIF HOME MEKI MAMAC

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

BRODILON DERATIZACIJSKO LJEPILO

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

Ljepilo u tubi za deratizaciju te suzbijanje kukaca.

Upotreba:

Deratizacijsko Ljepilo koje se upotrebljava za uništavanje štetnih glodavaca i insekata. BRODILON deratizacijsko Ljepilo nanosimo na:

- podlogu (drvo, papir ili karton) koju odlažemo u blizinu kretanja štetnika. Radi boljeg učinka postaviti mamac na sredinu podloge (komadić hrane);
- trake za lovljenje, koje se upotrebljavaju u sprječavanju migracije štetnih insekata po stablima;
- ploče za lovljenje, koje se upotrebljavaju u voćnjacima i staklenicima za smanjivanje štetnih insekata.

PAKIRANJE Ljepilo je opremljeno u tubi od 135 g



Mamac na bazi tijesta namjenjen suzbijanju glodavaca u preventivnoj i protuepidemijskoj deratizaciji.

DJELATNA TVAR

Bromadiolon 0,05 g/kg

Upotreba:

BRODILON MEKI MAMAC je rodenticid na bazi bromadiolona, izrađen od brašna u malim 10 g vrećicama. Vrlo je učinkovit u suzbijanju svih vrsta štetnih glodavaca, kao što su sivi i crni štakor, te poljski i kućni miš.

Doza primjene: 10 - 60 g na svakih 2 - 10 m ovisno o štetniku

PAKIRANJE 5 kg



BRODILON MEKI MAMAC

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

BRODILON MAMAC

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

Žitni mamac za suzbijanje glodavaca.

DJELATNA TVAR
Bromadiolon 0,05 g/kg

Upotreba:

BRODILON mamac se upotrebljava u zatvorenim i urbanim prostorima, među kojima su skladišta poljoprivrednih proizvoda, industrijski pogoni, gospodarski objekti, i sl. za suzbijanje:

- kućnog miša (*Mus musculus*)
- sivog štakora (*Rattus norvegicus*) i crnog štakora (*Rattus rattus*)

BRODILON MAMCI se mogu upotrijebiti jednom ili više puta u tijeku godine, ovisno o pojavi glodavaca. Gorka neotrovna tvar dodana BRODILON mamcima onemogućuje njihovo konzumiranje od strane domaćih životinja, a tako i od djece.

Doza primjene: 20 - 150 g na svakih 3 - 10 m ovisno o štetniku

PAKIRANJE 20 kg



Mamac u obliku bloka za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju.

DJELATNA TVAR
Bromadiolon 0,05 g/kg

Upotreba:

upotrebljava se za suzbijanje štakora (*Rattus norvegicus*, *R. rattus*) i miševa (*Mus musculus*) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju.

Doza primjene: 20 - 100 g na svakih 2 do 10 m

PAKIRANJE 10 kg (500x20 g)



BRODILON BLOK

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

MYTHIC® GEL

SREDSTVO ZA DERATIZACIJU

PROFESIONALNA PRIMJENA



INSTANT INSEKTICID I MAMAC U OBLIKU GELA ZA UKLANJANJE ŽOHARA na javnim mjestima.

MYTHIC® GEL je insekticidni gel za uklanjanje žohara (Blattella germanica, Periplaneta americana i Blatta orientalis) u obliku nimfi i odraslih jedinki koji možete primjenjivati u čitavom kućanstvu, uključujući i kuhinju.

Koristi se na mjestima gdje se radi s hranom (tj. gdje se hrana prerađuje, skladišti i priprema), objektima za preradu hrane, javnim kuhinjama, restoranima, spremištima hrane, skladištima, trgovinama itd. Isto se tako može koristiti u javnim zgradama poput hotela, bolnica, zatvora, kazališta, trgovačkih i industrijskih objekata poput tvornica, trgovina, radionica itd.

PAKIRANJE 30 g (4x30 g)

Čvrsto organsko gnojivo - peletirani, fermentirani životinjski stajnjak, nastao kombinacijom govedeg i pilećeg stajnjaka, bez sjemena korova, bez prisustva GMO rezidua, pogodan za EKOLOŠKU proizvodnju.

FORMULACIJA: NPK 2,5:3:3

Proizvod nastao višefaznom preradom stajnjaka sa naših životinjskih farmi, gdje smo primjenom svjetskih prestižnih tehnologija uspjeli sačuvati hranjivu vrijednost za vašu polju i buduće nasade. EKO FERTIL je pasteriziran, bez prisutstva sjemena korova i drugog bilja, vrlo stabilan, niske vlažnosti, lako primjenjiv. Upotrebom EKO FERTIL-a vašem tlu vraćate organsku materiju i sve prirodne makro i mikro elemente koji su nestali dugogodišnjom eksploatacijom, uporabom umjetnih gnojiva, navodnjavanjem itd. Na ovaj način odgovorno, dosljedno prema našoj zemlji provodite našu zajedničku misiju: „PRIRODNO PRIRODI“ Vašoj zemlji vraćamo plodnost, a time i vaš uloženi trud, rad i novac će vam se višestruko vratiti. Odgovorni prema planetu, odgovorni prema potomstvu. EKO FERTIL sadržava uz makroelemente N,P,K i sve ostale makro i mirko elemente koji su potrebni za uspješan rast i razvoj uzgajanih biljaka. Posebnu vrijednost ovog gnojiva čini značajni udio ukupne humusne organske tvari, koja značajno pridonosi poboljšanju kako fizičko-kemijskih tako i mikrobioloških osobina tla. Isto tako, poznato je da prisutne huminske kiseline, koje mineralizacijom daju biljna hranjiva u ionskom obliku, u tlu ostvaruju i biostimulativni efekt na razvoj biljaka. U dobre karakteristike ovog gnojiva ubrajaju se i njegova prilagođenost jednostavnoj primjeni, što je povezano sa fizičkim svojstvima ovog gnojiva (peleti), čime se stječe prednost u odnosu na klasična organska gnojiva u njihovim

EKO FERTIL

EKOLOŠKO ORGANSKO GNOJIVO



prirodnim stanjima (stajnjak). Ujedno, obradom organskih materijala postignuto je i koncentriranje prisutnih hranjiva u gnojivu, čime se u znatno većoj mjeri manifestira njegov fertilizacijski efekt. Utvrđeni sadržaj teških metala je znatno ispod dozvoljenih količina. Prirodno prirodi je naš zadatak, naša misija, naša vizija, vratimo joj njeno kako bi nas ponovo podarila plodovima kojima se radujemo.

S našim proizvodom:
Hranite uzgajanu biljku 100 % organskim proizvodima; Poboljšavate strukturu tla i humusnog sloja 100% bez sjemenja korova; Postepeno se razgrađuje što dovodi do ujednačene razine prihrane biljaka, pri čemu izbjegavate periode njihovog gladovanja. Time dolazi do boljeg zdravstvenog stanja nasada. Po sastavu je složeno kompleksno gnojivo, jer sadrži mikro i makro elemente, korisne mikroorganizme a pri tome je 100% bez patogenih agensa. Veličina gradivnih čestica EKO FERTIL-a je dovoljno velika te se sastojci neće brzo otpuštati, a samim time smo zaštitili vaše nasade od ispiranja. Vrhunsko organsko gnojivo, nastalo sinergijom veterinarskih i agronomskih znanja.

PAKIRANJE 20 kg

AMATERSKA PRIMJENA



NOVAG AGROCHEMICALS d.o.o.

POSLOVNI CENTAR NOVAKI

Sjedište i skladište
Odvojak industrijske ulice 1
10431 Novaki, grad Sv. Nedelja
+385 1 4816 645
info@novag.hr

GLAVNO SKLADIŠTE

Chromos Agro d.o.o.
Radnička cesta 173, 10002 Zagreb

www.novag.hr