

Programi zaštite ratarskih kultura

Poštovani,

AgroChem MAKŠ već devet godinu zaredom izdaje priručnik s orijentacijskim programima zaštite ratarskih kultura. Nadamo se da će Vam i u sezoni 2016. biti od pomoći da postignete dobre rezultate u zaštiti Vaših ratarskih kultura. Naš se prodajni program iz sezone u sezonu proširuje pa Vam i u sezoni 2016. predstavljamo nekoliko noviteta koji će naći opravdano mjesto u zaštiti Vaših kultura. Od ove godine AgroChem MAKŠ predstavlja:

- **BETTIX WG** - selektivno zemljišni herbicid za suzbijanje najvažnijih jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u šećernoj repi.
- **TARGA** - selektivni herbicidni pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim kulturama.
- **YAMATO** - sistemski fungicid namijenjen preventivnom i kurativnom suzbijanju širokog spektra biljnih bolesti u žitaricama.
- **KARIS** - kontaktno-želučani insekticid iz skupine piretroida namijenjen za suzbijanje štetnika u pšenici, ječmu, šećernoj repi i uljanoj repici.
- **CYTHRIN MAX** - insekticid koji djeluje kontaktno i želučano i primjenjuje se za suzbijanje štetnika u vinovoj lozi, povrću i ratarskim kulturama.

Na adresi www.agrochem-maks.com možete naći dodatne informacije o svim proizvodima koje preporučujemo u zaštiti ratarskih kultura.

Vaš AgroChem MAKŠ d.o.o.




programi zaštite

KUKURUZ



namjena	sredstvo	količina	vrijeme primjene
SUZBIJANJE ŠTETNIKA U TLU			
štetnici u tlu (žičnjaci, sovice, grčice hrušta..)	NUFOS	6-8 l/ha, prskanjem cijele površine uz obaveznu inkorporaciju u tlo	prije sjetve
štetnici u tlu (žičnjaci, sovice, grčice hrušta..)	KENTAUR 5 G	8-10 kg/ha	depozitorima sa sjetvom
OSNOVNO TRETIRANJE U SUZBIJANJU KOROVA			
jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi	KOBAN T	3-4 l/ha	nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista
KOREKTIVNO TRETIRANJE U SUZBIJANJU KOROVA			
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (ambrozija, šćir, loboda, dvornik, mračnjak, kamilica, osjak, slak i dr.)	MUSTANG	0,6 l/ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-5 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	PRINCIPAL PLUS 66,5 WG + TREND 90	440 g/ha + 0,1 %	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	DUOPAK TAROT 25 DF + MUSTANG + okvašivač TREND 90	1 pak. dostatno za 1 ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi	DUOPAK PRINCIPAL PLUS 66,5 WG + MUSTANG + okvašivač TREND 90	1 pak. dostatno za 1,5 ha	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni te djelomično neki širokolisni korovi	jednokratno TAROT 25 DF + okvašivač TREND 90 ili dvokratno TAROT 25 DF + okvašivač TREND 90	50-60 g/ha + 0,1 % 30+30 g/ha + 0,1 %	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-6 listova
jednogodišnji i višegodišnji travni te djelomično neki širokolisni korovi	PRINCIPAL 53,6 WG + TREND 90	90 g/ha + 0,1 %	nakon nicanja, kada kukuruz ima 2-7 listova
SUZBIJANJE ŠTETNIKA			
buhači i drugi štetnici nadzemnih dijelova biljke	NURELLE D	0,8 l/ha	kod pojave štetnika
kukuruzni moljac, sovice, žute kukuruzne sovice, usjevne sovice i kukuruzna zlatica	CYTHRIN MAX	150 ml/ha	kod pojave štetnika
kukuruzni moljac	CORAGEN 20 SC	150 ml/ha	u fazi odlaganja jaja; 2 puta godišnje




programi zaštite

STRNE ŽITARICE (pšenica, ječam i druge)



namjena	sredstvo	količina	vrijeme primjene
JESENSKO SUZBIJANJE KOROVA			
jednogodišnji travni i širokolisni korovi	HERBAFLEX	2 l/ha	od prvog lista do kraja busanja usjeva
PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA			
jednogodišnji travni i širokolisni korovi	HERBAFLEX	2 l/ha	od trećeg lista do kraja busanja usjeva
širokolisni korovu (bročika, kamilica, osjak, slak, mišjakinja, gorušica, grahorice..)	MUSTANG	0,4-0,6 l/ha	od početka busanja do 1. koljenca (stadij 21-31 ZCK)
	LANCELOT 450 WG	33 g/ha	od početka busanja do 2. koljenca (stadij 21-32 ZCK)
širokolisni korovu (bročika, kamilica, osjak, slak, mišjakinja, mrtva kopriva, štavelj..)	GRANSTAR 75 DF + STARANE 250*	15-20 g/ha + 0,4-0,5 l/ha	od početka busanja do 2. koljenca (stadij 21-32 ZCK)
širokolisni korovi (osjak, kamilica, samonikli suncokret...)	LONTREL 300	0,3 l/ha	od sredine busanja do 2. koljenca (stadij 25-32 ZCK)
SUZBIJANJE ŠTETNIKA			
lisne uši, žitni balac i drugi štetnici	CYTHRIN MAX	50 ml/ha	u vrijeme pojave štetnika (ako su prisutni odrasli štetnici, ličinke i jaja, prednost ima insekticid NURELLE D)
	NURELLE D	0,5 l/ha	
	KARIS	0,1-0,15 l/ha	
SUZBIJANJE BOLESTI			
rana i kasna pojava pepelnice i hrđe, bolesti polijeganja, pjegavost lista	IMPACT 25 SC	0,5 l/ha	od sredine busanja do klasanja
rana i kasna pojava pepelnice i hrđe, bolesti polijeganja, pjegavost lista i klasa te palež klasa pšenice	TOPSIN M 500 SC	1,4 l/ha	od sredine busanja do 2. koljenca i od početka klasanja do pune cvatnje
	YAMATO	1,5-1,75 l/ha	
SPECIJALNA GNOJIVA			
povećanje sadržaja proteina	MEGAFOL PROTEIN	3 l/ha	pred cvatnju i u cvatnji

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



HERBICID
LANCELOT 450 WG

*Najmoćniji protivnik
korova u
svim žitaricama.*




programi zaštite

SOJA



namjena		sredstvo	količina	vrijeme primjene
OSNOVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA				
jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi		SENAT WG +	0,5-0,75 kg/ha	nakon sjetve, a prije nicanja korova
jednogodišnji travni korovi		zemljišni graminicid		
KOREKTIVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA				
jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi	jednokratno	LAGUNA 75 WG + okvašivač TREND 90	100 g/ha + 0,1 %	od prve do četvrte troliske soje
	dvokratno - prvi tretman	LAGUNA 75 WG + okvašivač TREND 90	50 g/ha + 0,1 %	od kotiledona do četvrte troliske soje
	dvokratno - drugi tretman	LAGUNA 75 WG + HARMONY SX + okvašivač TREND 90	50 g/ha + 12 g/ha + 0,1 %	od prve do četvrtke troliske soje
	(HARMONY SX pospješuje djelovanje na lobodu, osjak i neke druge korove)			
jednogodišnji travni korovi		TARGA	1,5-2 l/ha	kada su korovi u fazi 2-5 listova
višegodišnji travni korovi		TARGA	1,5-2,5 l/ha	kada su korovi visine 20-30 cm
SUZBIJANJE BOLESTI				
plamenjača		GALBEN M	2,5 kg/ha	kod pojave prvih simptoma
plamenjača		NEORAM WG	2,5 - 3 kg/ha	kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti




programi zaštite

SUNCOKRET



namjena	sredstvo	količina	vrijeme primjene
SUZBIJANJE ŠTETNIKA U TLU			
žičnjaci, sovice, grčice hrušta..	NUFOS	6-8 l/ha	prije sjetve prskanjem cijele površine uz obvezatnu inkorporaciju u tlo
žičnjaci, sovice, grčice hrušta..	KENTAUR 5 G	8-10 kg/ha	depozitorima sa sjetvom
OSNOVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA			
jednogod. širokolisni i travni korovi	GOAL + flukloridon + zemljišni graminicid	0,4-0,5 l/ha	nakon sjetve, prije nicanja
KOREKTIVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA			
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (ambrozija, abutilon, mračnjak, loboda, divlja paprika, šćir, kiselica, osjak i dr.)	EXPRESS 50 SX + okvašivač TREND 90 ▼ ▼ samo za ▼ ▼ P64LE25, P64LE99	jednokratno: 45 g/ha EXPRESS 50 SX + 0,1% TREND 90	kad je suncokret u fazi 2 do 8 pravih listova, a korovi 2 do 4 pravih listova
		dvokratno: 25+20 g/ha EXPRESS 50 SX + 0,1 % TREND 90	
jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5-2 l/ha	nakon nicanja kada korovi imaju 2 do 5 listova
višegodišnjii travni korovi	TARGA	1,5-2,5 l/ha	kada su korovi visine 15-20 cm
SUZBIJANJE ŠTETNIKA			
lisne uši	NUFOS	1 - 2 l/ha	kod pojave uši u kritičnom broju
SUZBIJANJE BOLESTI			
plamenjača	NEORAM WG	2,5 - 3 kg/ha	kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.




programi zaštite
ULJANA REPICA



namjena	sredstvo	količina	vrijeme primjene
SUZBIJANJE KOROVA			
jednogodišnji širokolisni korovi	REACTOR 360 CS	0,27-0,33 l/ha	primjenjuje se u kombinaciji s drugim zemljišnim herbicidima nakon sjetve, a prije nicanja najviše dva dana nakon sjetve
širokolisni korovi (kamilica i dr.)	LONTREL 300	0,2-0,3 l/ha	kada su korovi u fazi 2 do 6 listova
jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5-2 l/ha	kada su korovi u fazi 2-5 listova
samonikle žitarice		1-1,5 l/ha	kada su samonikle žitarice u fazi tri lista do sredine busanja
višegodišnji travni korovi		1,5-2,5 l/ha	kada su korovi visine 20-30 cm
SUZBIJANJE BOLESTI LISTA, STABLIJKE I KOMUŠKE			
plamenjača	NEORAM WG	2,5-3 kg/ha	kod povoljnih uvjeta za razvoj bolesti
koncentrična pjegavost, siva plijesan, suha trulež, bijela trulež	TOPSIN M 500 SC	1,2 l/ha	jesenska primjena u fazi 4-6 razvijenih listova
	TOPSIN M 500 SC	1,4 l/ha	proljetna primjena od faze pune cvatnje do opadanja latica
SUZBIJANJE ŠTETNIKA			
buhači, ose listarice i dr. štetnici	CYTHRIN MAX	0,05 l/ha	kod pojave štetnika
lisne uši i drugi štetnici	NURELLE D	0,5 l/ha	kod pojave štetnika
	NUFOS	1,5-2 l/ha	kod pojave štetnika
repičin sjajnik i repičine pipe	KARIS	0,1-0,12 l/ha	u pupanju kod pojave kritične brojnosti
lisne uši i drugi štetnici	NURELLE D	0,5 l/ha	u pupanju kod pojave kritične brojnosti
	NUFOS	1,5-2 l/ha	u pupanju kod pojave kritične brojnosti
DESIKACIJA			
desikacija uljane repice	MISSION	3 l/ha	u vrijeme zrelosti ili blizu zrelosti uljane repice

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.




programi zaštite

➤ ŠEĆERNA REPA



namjena	sredstvo	sredstvo	vrijeme primjene
SUZBIJANJE KOROVA PRIJE PRIPREME TLA			
svi ponikli korovi	GLYFOS	1,5-4 l/ha	prije pripreme tla
SUZBIJANJE ŠTETNIKA - PRIJE PRIPREME TLA ZA SJETVU			
štetnici u tlu (žičnjaci, sovice, grčice hrušta...)	NUFOS	6-8 l/ha ili	prije sjetve prskanjem cijele površine uz obavezno unošenje u tlo u trake sa sjetvom
		2-3 l/ha	
TRETIRANJE KOROVA PRIJE NICANJA			
jednogodišnji i višegodišnji korovi	MISSION + TREND 90	1,5-2 l/ha + 0,1 %	nakon sjetve, a prije nicanja repe
OSNOVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA			
jednog. širokolisni i neki uskolisni korovi	BETTIX WG	3 kg/ha	nakon sjetve, prije nicanja repe
PRVO KOREKTIVNO TRETIRANJE			
jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji travni korovi	BEETUP TRIO + LONTREL 300 + TREND 90	0,8-1 l/ha + 0,1-0,15 l/ha + 0,1%	u vrijeme nicanja repe i korova (faza kotiledona)
DRUGO KOREKTIVNO TRETIRANJE			
jednogodišnji širokolisni korovi ambrozija, samonikli suncokret, kamilica, osjak, čičak	BETTIX WG + BEETUP TRIO + OBLIX 500 + LONTREL 300 + SAFARI + TREND 90	1-1,75 kg/ha + 1,5-1,8 l/ha + 50-100 ml/ha + 0,15-0,3 l/ha + 30-40 g/ha + 0,1-0,2%	nakon nicanja repe i korova kada repa ima 2 prava lista, tj. 7-14 dana nakon prve korekcije
AKO JE IZOSTALO PRVO I DRUGO KOREKTIVNO TRETIRANJE			
širokolisni korovi	BETTIX WG + BEETUP TRIO + OBLIX 500 + LONTREL 300 + SAFARI + TREND 90	1-1,75 kg/ha + 2 l/ha + 100 ml/ha + 0,3 l/ha + 30-40 g/ha + 0,1-0,2%	nakon nicanja, kada šećerna repa ima razvijena 4 prava lista
SUZBIJANJE LJETNOG SPEKTRA KOROVA			
vilina kosica	KERB 50 W	3 kg/ha	od 4. lista šećerne repe
KOREKTIVNO SUZBIJANJE TRAVNIH KOROVA			
jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5-2 l/ha	kada su korovi u fazi 2-5 listova
višegodišnji travni korovi		1,5-2,5 l/ha	kada su korovi visine 20-30 cm
SUZBIJANJE ŠTETNIKA			
buhači i ostali štetnici	NURELLE D	0,6 l/ha	kod pojave štetnika u kritičnom broju
lisne uši, sovice, pipe i ostali štetnici	CYTHRIN MAX	100 ml/ha	kod pojave štetnika u kritičnom broju
lisne uši, sovice, pipe i ostali štetnici	KARIS	0,1-0,15 l/ha	kod pojave štetnika u kritičnom broju
lisne uši	ROGOR 40	0,75-1 l/ha	kod pojave štetnika u kritičnom broju
TRETIRANJE FUNGICIDIMA - SUZBIJANJE BOLESTI			
pjegavost lista	IMPACT 25 SC + NEORAM WG	0,25 l/ha + 2,5-3 kg/ha	kod pojave simptoma bolesti
pjegavost lista	EMINENT 125 EW * + NEORAM WG	0,8 l/ha + 2,5-3 kg/ha	kod pojave simptoma bolesti
pjegavost lista	TOPSIN M 500 SC + NEORAM WG	1,2 l/ha + 2,5-3 kg/ha	kod pojave simptoma bolesti



U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prodiranje i prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

BEETUP TRIO



fenmedifam 61,4 g/l + desmedifam 61,4 g/l + etofumesat 59,7 g/l



Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

Uspješno suzbija:

- šćir (*Amaranthus retroflexus*)
- lobodu (*Chenopodium album*)
- broćiku (*Galium aparine*)
- dvornike (*Polygonum spp.*)
- crnu pomoćnicu (*Solanum nigrum*)
- mišjakinju (*Stellaria media*)
- poljsku gorušicu (*Sinapis arvensis*)
- obični kužnjak (*Datura stramonium*)
- običnu dimnjaču (*Fumaria officinalis*)
- mak turčinak (*Papaver rhoeas*)
- obični kostriš (*Senecio vulgaris*)
- jednogodišnji čistac (*Stachys annua*)
- perzijsku čestoslavicu (*Veronica persica*)
- divlju rotkvu (*Raphanus raphanistrum*)
- rusomaču (*Capsella bursa-pastoris*)
- potočnicu (*Myosotis arvensis*)
- dikice (*Xanthium spp.*)
- ambroziju u ranoj fazi (*Ambrosia artemisifolia*)
- poljsku ljubicu (*Viola arvensis*)

U fazi kotiledona dobro suzbija i mračnjak (*Abutilon theophrasti*) i neke jednogodišnje travne korove u fazi 1 do 2 lista.



NADMOĆNA KOMBINACIJA ZA SUZBIJANJE KOROVA U ŠEĆERNOJ REPI!

programi zaštite


➤ KRUMPIR



namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
ZAŠTITA PRIJE SADNJE				
svi ponikli korovi	GLYFOS	1,5-4 l/ha	OVP	prije pripreme tla za sadnju
štetnici u tlu (žičnjaci, sovice, grčice hrušta..)	KENTAUR 5 G	8-12 kg/ha	OVP	prije sadnje uz inkorporaciju u redove
štetnici u tlu (žičnjaci, sovice, grčice hrušta..)	NUFOS	6-8 l/ha	91 dan	prije sadnje, prskanjem površine uz obaveznu inkorporaciju
OSNOVNO TRETIRANJE U SUZBIJANJU KOROVA				
jednogodišnji travni i širokolisni korovi	MISSION	1,5-2 l/ha	14 dana	nakon sadnje, a prije nicanja krumpira na iznikle korove
jednogodišnji travni i širokolisni korovi	REACTOR 360 CS	0,2-0,3 l/ha	OVP	nakon sadnje, a prije nicanja
jednogodišnji širokolisni korovi	SENAT	0,75-1,5 kg/ha	42 dana	nakon sadnje, a prije nicanja
KOREKTIVNO TRETIRANJE U SUZBIJANJU KOROVA				
jednogodišnji širokolisni korovi	SENAT WG	0,5-0,75 kg/ha	42 dana	kada je krumpir u fazi 5-8 listova
širokolisni korovi	TROY 480	2 l/ha ili split aplikacija 1l/ha + 1 l/ha	OVP	do visine cime 15 cm, na iznikle širokolisne korove
jednogodišnji i višegodišnji travni te neki jednogodišnji širokolisni korovi	TAROT 25 DF + TREND 90 ili	50-60 g/ha + 0,1-0,2 %	42 dana	jednokratno kada je krumpir visine 10-20 cm
	TAROT 25 DF + TREND 90	30 + 20-30 g/ha + 0,1-0,2 %	42 dana	dvokratno, prvi puta kada je krumpir visine 10-20 cm.
jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5 – 2 l/ha	77 dana	kada korovi razviju 2-5 listova
višegodišnji travni korovi	TARGA	1,5-3 l/ha	77 dana	kada su korovi visine 10 do 30 sm
SUZBIJANJE BOLESTI				
plamenjača, koncentrična pjegavost, pjegavost lišća	NEORAM WG ili 	2,5-3 kg/ha	14 dana	preventivno, prije pojave bolesti
	DITHANE M-45 ili	2,5 kg/ha	14 dana	
	DITHANE DG NEOTEC ili	2,5 kg/ha	14 dana	
	GALBEN C ili	5-6 kg/ha	14 dana	
	EQUATION PRO ili	0,4-0,6 kg/ha	14 dana	
	FANTIC M/GALBEN M	2-2,5 kg/ha	14 dana	
plamenjača	ALFIL DUPLO	3-4 kg/ha	21 dan	preventivno, prije pojave bolesti
alternarija	DIFCOR	0,4-0,5 l/ha	30 dana	preventivno, prije pojave bolesti
SUZBIJANJE ŠTETNIKA				
krumpirova zlatica	CORAGEN 20 SC	50-60 ml/ha	14 dana	primjena u dozi 60 ml/ha u početku pojave krumpirove zlatice osigurava produženo djelovanje
krumpirova zlatica	LASER 	100 – 150 ml/ha	7 dana	kod pojave štetnika
krumpirova zlatica i lisne uši	NURELLE-D ili	0,6 l/ha	21 dana	kod pojave štetnika u kritičnom broju
	DALI	0,25-0,5 l/ha	42 dana	
DESIKACIJA				
desikacija	MISSION	4 l/ha	14 dana	desikacija cime krumpira
ZAŠTITA U SKLADIŠTU				
protiv klijanja krumpira u skladištima	NEO-STOP	100 g/100 kg krumpira	1 dan	kod unošenja u skladište. Ako se čuva dulje od 3 mjeseca, tretman treba ponoviti.

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.





klorpirifos 50 g/kg

KENTAUR 5 G

**Uništite sve
zemljišne štetnike
na vrijeme!**

Kontaktini, zemljišni insekticid, u granuliranom obliku izrazito dubinskog djelovanja!

Primjenom preko tla odlično suzbija sve najznačajnije zemljišne štetnike: žičnjake, grčice hrušta, sovice pozemljuše, ličinke lukove i kupusne muhe (rodovi Phorbia i Hymelia) te ostale vrtne mušice.

Jedini granulirani zemljišni insekticid na tržištu s najnovijim europskim dozvolama!

***Primjenjuje se na velikom broju kultura:
u krumpiru, kukuruzu, suncokretu i različitim povrtnim kulturama!***

programi zaštite

DUHAN



namjena	sredstvo	količina	vrijeme primjene
SUZBIJANJE ŠTETNIKA U TLU			
žičnjaci, sovice, grčice hrušta..	NUFOS	6-8 l/ha	prije sjetve prskanjem cijele površine uz obvezatnu inkorporaciju u tlo
OSNOVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA			
jednogodišnji travni i širokolisni korovi	herbicide na osnovi pendimetalina	4-6 l/ha	prije rasađivanja
	herbicide na osnovi klomazona (48 %)	0,6 l/ha	
KOREKTIVNI TRETMAN U SUZBIJANJU KOROVA			
jednogodišnji travni korovi	TARGA	1,5-2 l/ha	nakon nicanja, kada korovi imaju 2-5 lista
višegodišnji travni korovi		1,5-2,5 l/ha	kada korovi dosegnu visinu 20-30 cm
SUZBIJANJE ŠTETNIKA			
lisne uši	ROGOR 40	0,5-1,5 l/ha	u vrijeme pojave štetnika
kornjaši, lisne uši, tripsi, moljci	CYTHRIN MAX	100 ml/ha	u vrijeme pojave štetnika
lisne uši	DALI	0,25-0,5 l/ha	u vrijeme pojave štetnika
tripsi		1,25 l/ha	
SUZBIJANJE BOLESTI			
plamenjača duhana	GALBEN M	2,5-3 kg/ha	u vegetaciji od 4 lista i kasnije

YAMATO

tiofanat metil 233 g/l + tetrakonazol 70 g/l



pepelnice, hrđe, pjegavosti i fuzarioze

YAMATO je sistemski fungicid namijenjen preventivnom i kurativnom suzbijanju širokog spektra biljnih bolesti na svim žitaricama. Premium fungicid, prikladan za suzbijanje mnogih biljnih bolesti na žitaricama. Bazira se na dvije aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja pa je izuzetno pogodan u antirezistentnim programima zaštite. Osigurava izrazito dugu preventivnu kao i kurativnu zaštitu protiv najznačajnijih oboljenja lista, zaustavlja prodiranje patogena u biljku i dodatno zaustavlja širenje infekcije unutar biljke.

MEGAFOL PROTEIN



Više proteina i viši prinos pšenice.



MEGAFOL Protein maksimizira vrijednost Vaših usjeva pšenice i lucerne na način da prirodnim putem stimulira pojačano nakupljanje proteina. Njegovi izvanredni rezultati su potvrđeni preciznim genomskim analizama i ponavljanim pokusima.

 **Valagro**[®]
Where science serves nature