

Programi zaštite voćnjaka i vinograda

Poštovani voćari i vinogradari,

AgroChem MAKS već devetu godinu zaredom izdaje priručnik s orijentacijskim programima zaštite vinograda i voćnjaka. Nadamo se da će Vam i u sezoni 2016. biti od pomoći da postignete dobre rezultate u zaštiti svojih nasada.

U sezoni 2016. Vam donosimo i nekoliko noviteta koji će zasigurno naći svoje mjesto u zaštiti Vaših kultura. Od ove godine AgroChem MAKS predstavlja:

- **PYXAL** - kontaktni želučani insekticid namijenjen suzbijanju štitastih uši i bijele mušice na agrumima, maslinama, vinovoj lozi, voću, povrću i ukrasnom bilju.
- **ALFIL WG i ALFIL DUPLO** - dva nova fungicida na osnovi aktivne tvari *fosetil* s površinskim uzlaznim i silaznim sistemskim djelovanjem. Namijenjeni su suzbijanju biljnih bolesti, prvenstveno plamenjače i vlažne truleži na agrumima, vinovoj lozi i jezgričavom voću.
- **DRIZA WG** - je novi kontaktni fungicid-botriticid na osnovi djelatne tvari *iprodion* namijenjen suzbijanju sive plijesni na vinovoj lozi i rajčici.
- **LASER** - suvremeni insekticidni pripravak na osnovi potpuno prirodne i ekotoksikološki povoljne aktivne tvari *spinosad*, namijenjen za borbu protiv štetnih kukaca u povrću, ukrasnom bilju, vinovoj lozi, krumpiru i jabukama.

Na adresi www.agrochem-maks.com možete naći dodatne informacije o svim proizvodima koje preporučujemo u uzgoju vinove loze i drugih voćarskih kultura. Za sva dodatna pitanja obratite nam se s povjerenjem.

Vaš AgroChem MAKS d.o.o.



programi zaštite

VINOVA LOZA



MIROVANJE VEGETACIJE



namjena i sredstvo	konc.	količina u 100 l vode
crna pjegavost, dezinfekcija rana NEORAM WG	0,5 %	500 g
jaja crvenog pauka, štitaste uši mineralno ulje		

VUNASTI PUP, ZELENI VRH (B, C)



namjena i sredstvo	konc.	kol. u 100 l vode
crna pjegavost NEORAM WG	0,5 %	500 g
grozdov savijač AVAUNT EC	0,025 %	25 ml
grinje, pepelnica COSAVET DF	2-3 %	2-3 kg

PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	kol. u 100 l vode
jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS + GOAL	1-1,5 % 0,3-0,4 %	1-1,5 l 0,3-0,4 l

2-4 RAZVIJENA LISTA (D-F)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
crna pjegavost DITHANE M-45 ili FOLPAN® 80 WDG	0,25 % 0,15-0,2 %	250 g 150-200 g
pepelnica COSAVET DF ili KARATHANE GOLD 350 EC	0,3 % 0,05-0,06 %	300 g 50-60 ml
lozine grinje, crveni pauk, žuti lozin pauk KRAFT 18 EC	0,075-0,15 %	75-150 ml

IZBOJCI 20 - 40 cm (F-G)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
crna pjegavost i plamenjača FANTIC M ili GALBEN M ili ALFIL DUPLO	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,3-0,35 %	200-250 g 200-250 g 300-350 g
pepelnica COSAVET DF ili KARATHANE GOLD 350 EC	0,3 % 0,05-0,06 %	300 g 50-60 ml
štitaste uši PYXAL	0,025-0,075 %	25-75 ml

PRED CVATNJU (H-I)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača FANTIC F ili CURZATE F ili ALFIL DUPLO	0,2-0,25 % 0,25 % 0,3-0,35 %	200-250 g 250 ml 300-350 g
pepelnica COSAVET DF ili DOMARK 40 ME ili SYSTHANE 24 E	0,3 % 0,06-0,075 % 0,01-0,0125 %	300 g 60-75 ml 10-12,5 ml
groždani moljci RUNNER 240 SC ili AVAUNT EC ili LASER ili KRAFT 18 EC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,025 % 0,015-0,02 % 0,05-0,075 % 0,015-0,018 %	40 ml 25 ml 15-20 ml 50-75 ml 15-18 ml

PO CVATNJI (J)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača FANTIC F/M ili GALBEN M ili EQUATION PRO ili CURZATE F	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,04 % 0,25 %	200-250 g 200-250 g 40 g 250 ml
pepelnica COSAVET DF  + DOMARK 40 ME ili SYSTHANE 24 E	0,3 % 0,06-0,075 % 0,01-0,0125 %	300 g 60-75 ml 10-12,5 ml
siva plijesan PYRUS 400 SC	0,2-0,25 %	200-250 ml

LJETNO SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
jednogodišnj i višegodišnji korovi GLYFOS	1-1,5 %	1-1,5 l

RAST BOBICA (K)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača FANTIC F/M ili GALBEN M ili EQUATION PRO ili GALBEN C	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,04 % 0,4-0,5 %	200-250 g 200-250 g 40 g 400-500 g
pepelnica CRYSTAL ili  COSAVET DF + DOMARK 40 ME	0,02-0,025 % 0,3-0,5 % 0,06-0,075 %	20-25 ml 300-500 g 60-75 ml
groždani moljci RUNNER 240 SC ili AVAUNT EC ili CORAGEN 20 SC ili LASER 	0,04 % 0,025 % 0,015-0,018 % 0,015-0,02 %	40 ml 25 ml 15-18 ml 15-20 ml

PRED ZATVARANJE GROZDA (L)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača GALBEN C	0,4-0,5 %	400-500 g
pepelnica COSAVET DF  + CRYSTAL ili TALENDO	0,3-0,5 % 0,025-0,03 % 0,02 %	300-500 g 25-30 ml 20 ml
siva plijesan PYRUS 400 SC ili DRIZA WG	0,2-0,25 % 0,1-0,15 %	200-250 ml 100-150 g

U ŠARANJU (L)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača  NEORAM WG ili GALBEN C	0,2-0,3 % 0,4-0,5 %	200-300 g 400-500 g
pepelnica CRYSTAL ili TALENDO	0,025-0,03 % 0,02 %	25-30 ml 20 ml
siva plijesan PYRUS 400 SC ili DRIZA WG	0,2-0,25 % 0,1-0,15 %	200-250 ml 100-150 g

ZAVRŠNO TRETIRANJE



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača  NEORAM WG	0,2-0,3 %	200-300 g
pepelnica CRYSTAL ili TALENDO	0,025-0,03 % 0,02 %	25-30 ml 20 ml
lozin zeleni cvrčak AVAUNT EC	0,025 %	25 ml



= DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU!

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

programi zaštite

JABUKA



BUBRENJE PUPOVA (B-C)

namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
krastavost NEORAM WG	0,5 %	500 g
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05%	30-50 ml
jaja crvenog pauka i lisne uši mineralno ulje		

MIŠJE UŠI (C3)

namjena i sredstvo	koncentracija	kol. na 100 l vode
krastavost NEORAM WG + FOLPAN 80 WDG DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,5 % 0,2 % 0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	500 g 200 g 200-250 g 200-250 g
pepelnica COSAVET DF	0,5-0,6 %	500-600 g
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05 %	30-50 ml

CRVENE GLAVICE (D)

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili ZIRAM* 76 WG ili FOLPAN 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,25 % 0,2 %	200-250 g 200-250 g 250 g 200 g
+ PYRUS 400 SC	0,075%	75 ml
pepelnica COSAVET DF ili CRYSTAL	0,5-0,6 % 0,025-0,03%	500-600 g 25-30 ml

POČETAK CVATNJE (F)

namjena i sredstvo	koncent.	kol. na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	200-250 g 200-250 g
+ PYRUS 400 SC ili INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,075 % 0,06 % 0,015 %	75 ml 60 ml 15 ml
pepelnica CRYSTAL	0,02-0,03 %	20-30 ml
vlažna trulež korijena i korijenovog vrata ALFIL WG	0,25-0,3 %	250-300 g

PUNA CVATNJA (G)

namjena i sredstvo	koncent.	kol. na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili ZIRAM* 76 WG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,25 %	200-250 g 200-250 g 250 g
+ PYRUS 400 SC ili INDAR 5 EW ili DIFCOR ili DOMARK 40 ME	0,075 % 0,06 % 0,015 % 0,1%	75 ml 60 ml 15 ml 100 ml
vlažna trulež korijena i korijenovog vrata ALFIL WG	0,25-0,3 %	250-300 g

POSLIJE CVATNJE (H)

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200-250 g 200 g
+ INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,06 % 0,015 %	60 ml 15 ml
crveni voćni pauk KRAFT 18 SC	0,075-0,15 %	75-150 ml
lisne uši, minerali DALI	0,025 %	25 ml

PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode
jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS + GOAL	1-1,5 % 0,3-0,4 %	1-1,5 l 0,3-0,4 l uz potrošnju 200-300 l vode/ha prskanjem u trake
svi iznikli korovi GALAXIA	4-6 l/ha	u nasadima starijim od 3 g. nakon nicanja korova

II. POSLIJE CVATNJE (I)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,06 % 0,015 %	200-250 g 200-250 g 200 g 60 ml 15 ml
jabučni savijač i lisni mineri RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC ili PYRINEX® 250 ME ili LASER	0,04 % 0,016-0,02 % 0,2-0,3 % 0,06-0,08 %	40 ml 16-20 ml 200-300 ml 60-80 ml

III. POSLIJE CVATNJE (I)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC + DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075-0,1 %	200-250 g 200-250 g 75-100 ml
krvava uš, lisne uši DALI	0,05 %	50 ml
jabučni savijač CORAGEN 20 SC ili LASER	0,016-0,02 % 0,06-0,08 %	16-20 ml 60-80 ml

IV. POSLIJE CVATNJE (I)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC + DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075-0,1 %	200-250 g 200-250 g 75-100 ml
savijač pokožice ploda RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,016-0,02 %	40 ml 16-20 ml
crveni pauk, koprivina grinja, rdasta grinja KRAFT 18 SC	0,075-0,15 %	75-150 ml

LJETNA TRETIRANJA *



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + COSAVET DF ili CRYSTAL	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,3-0,5 % 0,025-0,03 %	200-250 g 200-250 g 200 g 300-500 g 25-30 ml
lisne uši, krvava uš DALI	0,05 %	50 ml
lisni mineri, jabučni savijač RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC ili PYRINEX® 250 ME ili LASER	0,04 % 0,016-0,02 % 0,2-0,3 % 0,06-0,08 %	40 ml 16-20 ml 200-300 ml 60-80 ml
skladišne bolesti TOPSIN M 500 SC	0,15 %	150 ml

LJETNO SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode
jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS	1-1,5 %	1-1,5 l uz potrošnju 200-300 l vode/ha prskanjem u trake
svi iznikli korovi GALAXIA	4-6l/ha	u nasadima starijim od 3 g. na sve iznikle korove

* U ljetnim tretiranjima od sredine lipnja, prskanje treba provoditi preventivnim fungicidima u razmacima 10-14 dana, ovisno o vremenskim prilikama



= DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU!

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

programi zaštite

KRUŠKA



KRETANJE VEGETACIJE (C-D)



namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode
krastavost i hrđe NEORAM WG	0,5 %	500 g
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05 %	30-50 ml
kruškina buha NUFOS	0,15 %	150 ml

PRED CVATNJU (E)



namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode
krastavost plodova NEORAM WG ili ZIRAM* 76 WG	0,5 % 0,25 %	500 g 250 g
pepelnica COSAVET DF	0,3-0,4 %	300-400 g

U CVATNJI (F2-G)



namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode
bakterijska palež NEORAM WG	0,05 %	50 g
krastavost plodova ZIRAM* 76 WG	0,25 %	250 g
vlažna trulež korjena ALFIL WG	0,25-0,3 %	250-300 g

POSLIJE CVATNJE (H)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost plodova DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + DIFCOR	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,015 %	200-250 g 200-250 g 200 g 15 ml
kruškina osica, lisne uši DALI	0,025 %	25 ml

RAST PLODOVA (I)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost plodova DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + DIFCOR ili INDAR 5 EW	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,015 % 0,05 %	200-250 g 200-250 g 200 g 15 ml 50 ml
kruškina buha KRAFT 18 SC	0,075-0,15 %	75-150 ml
pepelnica COSAVET DF	0,25-0,3 %	250-300 g

III. TRETIRANJE IZA CVATNJE



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost plodova DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + INDAR 5 EW ili DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,05 % 0,1 %	200-250 g 200-250 g 200 g 50 ml 100 ml
jabučni savijač RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC ili PYRINEX® 250 ME	0,04 % 0,016-0,02 % 0,2-0,3 %	40 ml 16-20 ml 200-300 ml

IV. TRETIRANJE POSLIJE CVATNJE



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost plodova DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + DOMARK 40 ME +	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,1 %	200-250 g 200-250 g 200 g 100 ml

SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
proletno suzbijanje korova GLYFOS + GOAL	1-1,5 % 0,3-0,4 %	1-1,5 l 0,3-0,4 l
svi iznikli korovi GALAXIA	4-6 l/ha	uz potrošnju 200-300 l vode/ha, prskanjem u trake
ljetno suzbijanje korova GLYFOS	1-1,5 %	u nasadima starijim od 3 god.

BOLESTI I ŠTETNICI KRUŠAKA

Zimskim prskanjem suzbijamo, odnosno smanjujemo potencijal zaraze uzročnika biljnih bolesti i prezimljujućih oblika štetnika. Na jabuci i kruški suzbijamo uzročnike pjegavosti lista i krastavosti plodova (fuzikladij) te prezimljujuće oblike nekih štetnika, kao što su: štitaste uši, zimska jaja crvenog pauka, lisnih ušiju i kruškine buhe. Prvo prskanje voćnjaka (zimsko) kod nas se obično obavlja bakrenim pripravcima (NEORAM WG i drugi) u kombinaciji s različitim uljima.

NEORAM WG (bakreni oksiklorid 37,5 %) je kontaktni, preventivni fungicidni pripravak koji pruža vrhunsku zaštitu uz minimalne doze primjene. Nova formulacija osigurava odličnu topivost preparata, izostanak prašenja kod

pripreme škropiva, bolje prijanjanje na biljci i odličnu pokrovnost.

U vegetaciji najznačajnija bolest koja napada krušku je naravno krastavost (*Venturia spp.*)

DOMARK 40 ME (tetrakonazol, 40 g/l) je sistemski fungicid s preventivnim, kurativnim i eradiktivnim djelovanjem. Odlične je pokrovnosti pa se vrlo brzo proširi i ravnomjerno usvaja u biljno tkivo. Koristi se za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuke i kruške. Kod krastavosti jabuke i kruške primijenjuje se u dozi od 1 l/ha, čim se stvore povoljni uvjeti za infekciju. Kod kurativnog tretiranja ga koristimo najkasnije tri dana poslije kiše koja uzrokuje infekciju i tretiranje ponovimo za 5-7 dana.

Jedan od najvažnijih štetnika kruške je **kruškina buha** (*Cacopsylla pyri*) koja se u nasadima pojavljuje već na samim počecima vegetacije i kroz cijelu sezonu, a štete nanosi sisanjem biljnih sokova i izlučivanjem medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice koje umanjuju asimilacijsku sposobnost biljke i tržišnu vrijednost plodova.

KRAFT 18 EC (abamektin 18 g/L) je loko-sistemski insekticid i akaricid koji uspješno suzbija kruškinu buhu te sve razvojne stadije, ne samo kalifornijskog tripsa, nego i mnogih drugih štetnika voća, povrća i ukrasnog bilja, uključujući lisne minere i grinje. Na štetnike djeluje kontaktno i želučano i vrlo brzo nakon primjene štetnici ostaju nepokretni, prestaju se hraniti i ugibaju.



KRAFT 18 EC

abamectin 18 g/l

- ▶ Specijalist za kruškinu buhu, štetne grinje i najvažnije štetnike u voćarstvu i povrtlarstvu
- ▶ Sigurno i dugotrajno djelovanje
- ▶ Široka registracija

programi zaštite

❖ BRESKVA, NEKTARINA I MARELICA



MIROVANJE VEGETACIJE (A)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
kovrčavost lista NEORAM WG 	0,5 %	500 g
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05%	30-50 ml
jaja štetnika mineralno ulje		

BUBRENJE PUPOVA (B)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
kovrčavost lista, palež cvijeta i rodni grančica NEORAM WG 	0,5 %	500 g
pepelnica COSAVET DF 	0,5-0,6 %	500-600 g

DO POČETKA CVATNJE (C-D)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
kovrčavost lista ZIRAM* 76 WG iii DIFCOR	0,25 % 0,02-0,03%	250 g 20-30 ml
tripsi ROGOR 40 ili DALI	0,075-0,1% 0,025 %	75-100 ml 25 ml

CVATNJA (F)



namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW	0,07 %	70 ml

PO CVATNJI (G)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
šupljikavost lista i monilija MERPAN ® 80 WDG + INDAR 5 EW	0,2-0,25 % 0,2 % 0,07 %	200-250 g 200 g 70 ml
lisne uši, tripsi DALI ili ROGOR 40	0,025 % 0,075-0,1 %	25 ml 75-100 ml

FORMIRANI PLODOVI (H)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
pepelnica i šupljikavost lista MERPAN ® 80 WDG + COSAVET DF ili CRYSTAL 	0,2 % 0,3-0,4 % 0,025-0,03 %	200 g 300-400 g 25-30 ml

RAST PLODOVA (I)



namjena i sredstvo	konc.	100 l vode
šupljikavost lista, pepelnica MERPAN ® 80 WDG + CRYSTAL ili DOMARK 40 ME	0,2 % 0,025-0,03 % 0,1 %	200 g 25-30 ml 100 ml
savijač, moljac RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC ili AVAUNT EC	0,04 % 0,016-0,02 % 0,033 %	40 ml 16-20 ml 33 ml
savijač, moljci, uši ROGOR 40	0,15 %	150 ml

PRED BERBU (ovisno o karenci)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
trulež plodova INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,1 % 0,02-0,03 %	100 ml 20-30 ml
pepelnica DOMARK 40 ME	0,1 %	100 ml

OPADANJE LIŠĆA U JESEN



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
bakterioze NEORAM WG 	0,3 %	300 g



= DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU!

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

programi zaštite
❖ VIŠNJA I TREŠNJA



POČETAK VEGETACIJE (A-B)

namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
šupljikavost lista, palež cvijeta, bakterioze NEORAM WG	0,5 %	500 g
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05%	30-50ml
jaja lisnih uši, štitaste uši mineralno ulje		

PRED CVATNJU (D-E)

namjena i sredstvo	koncentracija	kol. na 100 l vode
palež cvijeta i rodni grančica (<i>Monilia</i>) TOPSIN M 500 SC ili INDAR 5 EW	0,15 % 0,07 %	150 ml 70 ml

CVATNJA (F)

namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
palež cvijeta i rodni grančica (<i>Monilia</i>) TOPSIN M 500 SC ili INDAR 5 EW	0,15 % 0,07 %	150 ml 70 ml

ZAVRŠETAK CVATNJE

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW	0,06-0,09 %	60-90 ml
kožičavost i šupljikavost lista MERPAN® 80 WDG	0,2 %	200 g

II. TRETIRANJE IZA CVATNJE (I)

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
kožičavost lista TOPSIN M 500 SC	0,15	150 ml
lisne uši DALI	0,03 %	30 ml

III. TRETIRANJE IZA CVATNJE (J)

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
kožičavost lista TOPSIN M 500 SC	0,15 %	150 ml
trešnja muha ROGOR 40	0,75 %	75 ml

PRED BERBU

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
trulež ploda (<i>Monilia</i>) INDAR 5 EW	0,1 %	100 ml

POSLIJE BERBE

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
kožičavost lista DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili TOPSIN M 500 SC	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,15 %	200-250 g 200-250 g 150 ml

NAKON OPADANJA LIŠĆA

namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
bakterioze NEORAM WG	0,3 %	300 g



= DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU!

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

Domark[®] 40 ME

tetrakonazol 40 g/l



- ✓ Domark 40 ME je sistemski fungicid na osnovi djelatne tvari tetrakonazol.
- ✓ Domark 40 ME ima trostruko djelovanje: plinovito, translaminarno i sistemsko što je izuzetno važno za djelovanje na pepelnicu u ljetnom periodu i na grozdu.
- ✓ U slučaju oborina Domark 40 ME ima maksimalnu otpornost na ispiranje kišom.
- ✓ DOMARK 40 ME posjeduje preventivno i kurativno djelovanje s dužim intervalima između prskanja i nema fitotoksičnog djelovanja na biljku.
- ✓ Domark 40 ME ima izvrsno djelovanje u kombinaciji s fungicidima COSAVET DF, CRYSTAL te KARATHANE + provjereno dobro miješanje sa svim uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja.
- ✓ Zbog vrlo dobre selektivnosti Domark 40 ME se uspješno primjenjuje u vinogradima, breskvama, ali i na mnogim drugim voćnim i povrtnim kulturama.
- ✓ Osim pepelnice učinkovito suzbija i druge biljne bolesti poput krastavosti, pjegavosti, alternarije, hrđe i drugih.
- ✓ Registrirana primjena: VINOVA LOZA, BRESKVA, JABUKA, ŠLJIVA, DINJA, LUBENICA, KRASTAVAC, RAJČICA, PAPRIKA itd.



Triazol nove generacije vrhunske preventivne i kurativne učinkovitosti

programi zaštite
+ ŠLJIVA



BUBRENJE PUPOVA (B)			BIJELI PUP, POČETAK CVATNJE (D-E)			OPADANJE LATICA (G-H)		
namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentr.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentr.	kol. na 100 l vode
rogač šljive, palež cvijeta i rodni grančica NEORAM WG	0,5 %	500 g	palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW ili TOPSIN M 500 SC	0,06-0,09 % 0,15 %	60-90 ml 150 ml	palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,06-0,09 % 0,02 %	60-90 ml 20 ml
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05 %	30-50 ml	pepelnica COSAVET DF	0,2 %	200 g	šupljikavost lista DITHANE M-45	0,2-0,25 %	200-250 g
pepelnica COSAVET DF	0,2 %	200 g				šljivina osica, lisne uši ROGOR 40	0,075-0,1%	75-100 ml

FORMIRANJE PLODOVA (I)			RAST PLODOVA (J)			PRED BERBU (ovisno o karenci)		
namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
šupljikavost i hrđa DITHANE M-45	0,2-0,25 %	200-250 g	šupljikavost i hrđa DITHANE M-45	0,2-0,25 %	200-250 g	trulež plodova INDAR 5 EW ili TOPSIN M 500 SC	0,07 % 0,15 %	70 ml 150 ml
šljivin savijač CORAGEN 20 SC	0,018-0,02 %	18-20 ml	šljivin savijač CORAGEN 20 SC	0,018-0,02 %	18-20 ml			
lisne uši DALI	0,05 %	50 ml	lisne uši DALI	0,05 %	50 ml			
štitaste uši PYXAL	0,03-0,05 %	30-50 ml						



= DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU!

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.



SUZBIJANJE KOROVA				
namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
jednogodišnji travni i neki jednogodišnji širokolisni korovi	KERB 50 W	1 kg/ha	OVP	prije nicanja korova u novoposađenim i starim nasadima jagoda u mirovanju vegetacije

SUZBIJANJE BOLESTI				
namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
crvena trulež korijena	NEORAM WG 	0,2 – 0,3 %	3 dana	prije pojave bolesti, preventivno na početku i tijekom vegetacije
crna pjegavost lista, antraknoze, trulež korjenovog vrata	DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	2,1 kg/ha 2,1 kg/ha	15 dana 15 dana	prije pojave bolesti, preventivno, na početku i tijekom vegetacije
pepelnica	KARATANE GOLD 350 EC	0,4-0,6 l/ha	3 dana	u vegetaciji preventivno, kod opasnosti od pojave bolesti
pepelnica	CRYSTAL	30 ml/100 l vode	3 dana	preventivno, prije pojave bolesti
pepelnica	COSAVET DF 	2 kg/ha	5 dana	u vegetaciji kod pojave simptoma
siva plijesan	PYRUS 400 SC	2 l/ha	3 dana	preventivno u vegetaciji, kod opasnosti od pojave bolesti

SUZBIJANJE ŠTETNIKA				
namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
kalifornijski trips i sovice	LASER 	0,2-0,25 l/ha	3 dana	u vegetaciji kod pojave odraslih štetnika
crveni pauk i kalifornijski trips	KRAFT 18 EC	0,5-1,2 l/ha	7 dana	u vegetaciji kod pojave štetnika
štitasti moljci i lisne uši	DALI	0,75 l/ha 75 ml na 1000 m² kroz sustav za navodnjavanje	30 dana	u vegetaciji kod pojave štetnika



= DOZVOLJEN U EKOLOŠKOM UZGOJU!

U svim tretiranjima, preporučamo dodati i okvašivač **MASTER WETT**, koji pospješuje prijanjanje sredstva na tretiranu biljku.

GOSPODARSKI NAJPOVOLJNIJI BOTRITICID

PYRUS® 400 SC

pirimetanil 400 g/l - Sadrži 30% više djelatne tvari

Preventivni i kurativni fungicid, svojim izraženim površinskim i translaminarnim djelovanjem, pouzdano suzbija sivu plijesan (*Botrytis cinerea*) na vinovoj lozi. Uspješno se za istu namjenu primjenjuje i na jagodama, rajčici i drugom povrću, jabukama, kruškama, agrumima, cvijeću i ukrasnom bilju.

- Djeluje putem plinovite faze
- Učinkovit kod oštećenja od tuče, pri zalamanju zaperaka ili drugih mehaničkih oštećenja osjetljivih poljodjelskih kultura
- Vrlo brzo prodire u biljku te nema opasnosti od ispiranja kišom ili zalijevanjem
- Svestrani botriticid koji je 30% jači u odnosu na ostale botriticide s istom djelatnom tvari, a uz istu jediničnu cijenu

KARENCA NA JAGODI 3 DANA!



Prije upotrebe pripravka PYRUS 400 SC obavezno pročitajte uputu za primjenu.



® = reg. znak tvrtke AGRIPHAR




AgroChem
M A K S

Plamenjače više nisu problem!

Equation[®] Pro

Fungicid



Sigurnost bez kompromisa!

- Osigurava zaštitu od infekcije čak i kod **IZNIMNOG PRITISKA** bolesti.
- **IZUZETNO UČINKOVIT** u kontroli plamenjače vinove loze **NA GROZDU!**
- **VISOKA UČINKOVITOST** potvrđena kod zaštite **U CVATNJI**, ali i kod razvoja bobica.
- **IZVRSNO PRIJANJANJE** i **DUGOTRAJNA ZAŠTITA** bez obzira na količinu oborina.

NAJPRODAVANIJU FUNGICID U HRVATSKOJ!

MEGAFOL

ISKORAK U BUDUĆNOST

ANTISTRESNI PRIPRAVAK KOJI POTIČE RAST I RAZVOJ BILJAKA



ZA SVE KULTURNE BILJKE NA POLJU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

prirodni biostimulator, spoj najznačajnijih aminokiselina i faktora rasta, pojačava otpornost na izrazito stresne situacije, jača biljni organizam, osigurava hormonalnu ravnotežu, potiče rast, razvoj i produktivnost biljaka