



Intenzivan odgoj teladi sa kratkim periodom pred-odbića

Rješavanje problema odgoja daje osnovu za visoku proizvodnost i dugovječnost. U praksi su se dobrima pokazale intenzivne strategije pred-odbića.

Sažetak:

Odgovarajuća mliječna zamjenica je osnova uspješnog odgoja teladi. Program Kalbi Milch mliječnih zamjenica iz SCHAUMANN-a su visoko kvalitetne mliječne zamjenice, prilagođene za intenzivan i kratak period pred-odbića. U kombinaciji sa visoko kvalitetnom gotovom hranom, npr. Kalbi Flocks, rješenje odbića je lako dostižno.

- Temeljni preduvjet za zdravi početak života je kolostrum. Protokolarna upotreba Kalbi Vitala trebala bi biti rutina za dodatno podizanje vitalnosti. Odgovarajuća mliječna zamjenica osigurava zadovoljenje potreba teladi: što je tele mlađe to je potrebna bolja kvaliteta sirovina- mlada telad zahtijeva top-kvalitetu i laku probavljivost komponenti mliječne zamjenice. Naročito u sustavima ranog odbića neophodno je poštivati ovo temeljno pravilo.

Rano odbiće

Rani i visoki unos krmiva je „pod morati“ za strategije ranog odbića. Telad treba biti odbijena sa osam tjedana bez zastoja u rastu.

SCHAUMANN-Kalbi Milch program sadrži visoko-kvalitetne mliječne zamjenice kao što su Kalbi Milch Premium Spezial ili Kalbi Milch AMS, specijalno dizajnirane za rano odbiće. Oba proizvoda sadrže naš probiotik Provita LE.

Kalbi Milch AMS čini 45 % obranog mlijeka u prahu i svi proteinski izvori su iz mliječne baze. Za mladu telad to je osnova za najbolje rezultate.

Intenzivnost- koliko dnevne količine mliječne zamjenice?

Visoki dnevni prirasti cilj su za period pred-odbića.

To je osnova za rano prvo osjemenjivanje sa 15 mjeseci starosti i oko 400 kg težine junica. Uz količinu mliječne zamjenice tijekom glavnog perioda napajanja (do kraja 5. tjedna) od 1 kg po teletu dnevno važno je odrediti i koncentraciju napitka.

Različito tvrdnji u specijaliziranim medijima je zbunjujuća.

135 g u litri napitka je dobra mjera-vodič koja je oslonjena na suhu tvar punomasnog mlijeka. Podatak od 160 g u litri slijedi isto tako tu mjeru vodilju. Krajem 5. tjedna treba početi sa odbićem. Nakon 8 tjedana telad treba biti potpuno odbita od mlijeka. Ova metoda je dokazana u praksi. Kroz cijeli niz godina dobro Gut Hülseberg koristi ovu metodu.


Hranidba

Ako želite postići visoke dnevne priraste (prosjek od 700 g dnevno) tijekom perioda pred-odbića, 1 kg mliječne zamjenice ili odgovarajućih 6 kg punomasnog mlijeka , ne može zadovoljiti potrebe na energiji i proteinu teleta starijeg od 3 tjedna.

Rani i visoki konzum krmiva važan je za burag jer papile buraga trebaju kemijsku stimulaciju preko butirata i propionata za svoj dobar razvoj a te se tvari tvore iz smjesa.

Uspješne farme već godinama hrane svoju telad proizvodima kao što su Kalbi Flocks ili Kalbikraft. Visoki sadržaj suhe tvari poboljšava higijenu hranilica i optimira unos krmiva. Veliki broj pokusa na FH Bingen, Haus Riswick ili na dobru Gut Hülseberg to i potvrđuju. Komponente Kalbi Flocks Plus-a : pšenica, ječam i kukuruz su u solubilnoj formi koja promovira razvoj resica buraga.

Plan napajanja i hranidbe ženske teladi u odgju



Za korisnike punomasnog mlijeka Schaumann ima Kalbi Phosphoral SL Fit kojim se mlijeko zakiseljava i nadopunjuje njegov nedostatak mikroelemenata i vitamina. Dozacija je 60 g po teletu dnevno.

Schaumann Agri d.o.o.,
Kunovec Breg, Koprivnička 5-7, 48 000 Koprivnica
tel: 048 665 14, fax: 048 665 149,
e-mail: info@schaumann.hr, www.schaumann.hr